

Hörsaalübungsaufgaben und Lösungen zu komplexe Funktionen für Studierende der Ingenieurwissenschaften

Aufgabe 1:

Gegeben sind die komplexen Zahlen $z_1 := \frac{(1+2i)^2}{2-i}$ und $z_2 := \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$.

- Man ermittle Real- und Imaginärteil von z_1 und die Polardarstellungen von z_1 und z_2 .
- Man bestimme z_2^6 .
- Man gebe alle Lösungen der Gleichung $(w+z_2)^3 = 1$ in kartesischen Koordinaten an.

Aufgabe 2:

Man skizziere die folgenden Punktmengen in der komplexen Zahlenebene:

- $\{w \in \mathbb{C} : |w+z_2|^3 = |8i|\}$, mit $z_2 := \sqrt{3} - i$,
- $\{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq \sqrt{2}\}$,
- $\{z \in \mathbb{C} : 9\operatorname{Re}(z^2) + 13(\operatorname{Im}(z))^2 = 36\}$,
- $\{z \in \mathbb{C} : 3\pi/2 < \arg(zi) < 2\pi, 0 < |z|\}$.

Aufgabe 3:

Man untersuche die Folge

$$z_0 = 1 + i, \quad z_{n+1} = \frac{i}{2}(2 - i + z_n)$$

auf Konvergenz und bestimme ggf. den Grenzwert.

Aufgabe 4:

Für eine komplexe Zahlenfolge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zeige man die folgende Äquivalenz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z^* \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z^*) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z^*) .$$

Aufgabe 5:

- a) Man bestimme das Bild von $Q := \{z \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1, 0 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$ unter der durch $f(z) = iz^2 + 2$ definierten Abbildung.
- b) Gegeben seien $z_1 = 3 + \frac{\pi i}{4}$ und $z_2 = 1 - \frac{\pi i}{2}$. Man berechne

$$\exp(z_1), \exp(z_2) \quad \text{und} \quad \exp(z_1 + z_2)$$

in kartesischen Koordinaten und bestätige an diesem Beispiel die Gültigkeit der Funktionalgleichung der e -Funktion in \mathbb{C} :

$$\exp(z_1) \cdot \exp(z_2) = \exp(z_1 + z_2) .$$

Aufgabe 6:

- a) Für den Hauptwert des komplexen Logarithmus \ln und $z_1 = -i$ und $z_2 = -2i$ berechne man

$$\ln(z_1), \ln(z_2) \quad \text{und} \quad \ln(z_1 z_2),$$

falls dies möglich ist.

- b) Die \sin -Funktion wird im Komplexen definiert durch

$$\sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) .$$

Man berechne Real- und Imaginärteil von $\sin z$ und bestimme alle Lösungen von $\sin z = 2$.

Aufgabe 7:

Gegeben sei die Joukowski-Funktion $w = f(z) := \frac{1}{2} \left(\frac{z}{3} + \frac{3}{z} \right)$.

- a) Man bestimme die Bilder
 - (i) des Kreises $|z| = 3$,
 - (ii) des Halbstrahls $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z) > 0$,
 - (iii) des Halbstrahls $\operatorname{Re}(z) = 0, \operatorname{Im}(z) > 0$.
- b) Man berechne die Umkehrfunktion $z = f^{-1}(w)$ für $|z| > 3$.

Aufgabe 8:

Für die Inversion $w = f(z) := \frac{1}{z}$ mit $z \neq 0$ bestimme man das Bild

- a) der Geraden $\operatorname{Re}(z) = -1$,
- b) des Strahls $\operatorname{Im}(z) > 0 \wedge \operatorname{Re}(z) = 0$,
- c) des Kreises $|z| = 4$,
- d) des Kreises $|z - 1| = 1$ und
- e) des Kreises $|z - 1| = 3$.

Aufgabe 9:

Gegeben sei die Funktion $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$T(z) = \frac{2(1+i)z}{z-1-i}.$$

- a) Man überprüfe, ob es sich bei T um eine Möbiustransformation handelt.
- b) Man berechne alle Fixpunkte von T in kartesischer und Polardarstellung.
- c) Man bestimme das Bild der Winkelhalbierenden $\operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z$.
- d) Worauf wird die Halbebene oberhalb der Winkelhalbierenden abgebildet?
- e) Man berechne die Umkehrabbildung von T .

Aufgabe 10:

a) Man gebe eine Möbius-Transformation T an, mit:

$$T(0) = 0, \quad T(-2) = 4 \quad \text{und} \quad T(i-1) = 2 + 2i.$$

b) Liegen $z_0 = -1 - i$, $z_1 = 0$, $z_2 = -2$ und $z_3 = i - 1$ auf einem Kreis?

c) Man zeichne den Kreis $K : |z + 1| = 1$ und die Punkte $z_1 = 0$, $z_2 = -2$, $z_3 = i - 1$, sowie $T(K)$ mit $T(z_i)$ für $i = 1, 2, 3$.

Aufgabe 11:

Gesucht ist eine Möbius-Transformation $w = T(z)$ mit $T(1 + i) = -1 + i$ und $T(i) = 0$, die die Kreisscheibe $|z - 1 - i| \leq 1$ auf die Halbebene $\text{Im}(w) \geq \text{Re}(w)$ abbildet.

Aufgabe 12:

Für $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(z) = z^2$ berechne man

a) $A := \frac{1}{2} (f_x(z_0) - if_y(z_0))$ und

b) $B := \frac{1}{2} (f_x(z_0) + if_y(z_0))$.

Man vergleiche die Ergebnisse mit den Ableitungen von f nach den unabhängigen Variablen z und \bar{z} , also mit

$$\frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}.$$

Dabei sollen die bekannten Ableitungsregeln aus dem Reellen rein formal übertragen werden.

Aufgabe 13:

a) Man überprüfe, ob

(i) $f(z) = z \cdot \text{Im}(z)$ holomorph ist,

(ii) $g(z) = 2z + 2\bar{z} + 4i \cdot \text{Im}(z) - 3i$ holomorph ist,

(iii) $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 - 6xy - 3x^2$ harmonisch ist.

b) Man zeige, dass

$$u(x, y) = 4x^2 - 4y^2 - 12x + 9$$

harmonisch ist und konstruiere eine zu u konjugiert harmonische Funktion $v(x, y)$, d.h. eine Funktion v , für die die Funktion

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ mit $z = x + iy$ holomorph wird.

Aufgabe 14:

Gegeben seien die Kurven $c_1(t) = t$ für $t > 0$ und $c_2(t) = 4e^{it}$ für $-\pi < t < \pi$.

- a) Man skizziere die Kurven c_1 und c_2 in der z -Ebene und bestimme ihren Schnittpunkt mit Schnittwinkel.
- b) In welche Bildkurven der w -Ebene gehen c_1 und c_2 unter dem Hauptwert von $w = \sqrt{z}$ über? Man überprüfe, ob im Schnittpunkt der Bildkurven der Winkel und das lokale Längenverhältnis erhalten bleiben.

Aufgabe 15:

- a) Man skizziere die beiden Kreise $K_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = 1\}$ und $K_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 3\}$ und berechne die beiden Punkte z_1 und z_2 , die symmetrisch zu beiden Kreisen liegen.
- b) Man bestimme alle konformen Funktionen

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

mit $T(z_1) = 0$ und $T(z_2) = \infty$.

- c) Man skizziere das Bild von K_1 und K_2 unter T , wenn noch $T(0) = 1$ gilt.

Aufgabe 16:

Gegeben sei das durch die beiden Kreise $K_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = 1\}$ und $K_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 3\}$ berandete beschränkte Gebiet D .

Man berechne eine auf D harmonische Funktion, die auf K_1 den Wert 1 und auf K_2 den Wert 2 annimmt.

Hinweis: Man transformiere das Problem, wie in Aufgabe 11 angegeben, löse das konform verpflanzte Problem in Polarkoordinaten und transformiere zurück.

Aufgabe 17:

Man berechne direkt und mit Hilfe einer Stammfunktion

a) $\int_c z^3 + 4 dz$ entlang des geradlinigen Weges von $1 - i$ nach $1 + i$,

b) $\int_c ze^z dz$ für $c(t) = i\pi t$ mit $-1 \leq t \leq 0$,

c) $\int_{c_k} \frac{1}{z} dz$ für die Kurven $c_1(t) = it$ und $c_2(t) = e^{it}$ mit $\pi/4 \leq t \leq 3\pi/4$,

d) $\int_1^i \ln z dz$ für $c(\varphi) = e^{i\varphi}$ (positiv orientiert).

Aufgabe 18:

Man berechne ggf. mit Hilfe der Cauchyschen Integralformel die folgenden Kurvenintegrale (alle auftretenden Kurven seien positiv orientiert):

a) $\oint_c \frac{1}{z+2} dz$, $c: |z+1-i| = 1$,

b) $\oint_{c_{1,2}} \frac{z^2 - 2z + 2}{z^3 - z^2 + 2} dz$, $c_1: |z| = 0.5$, $c_2: |z| = 1.5$,

c) $\oint_{c_{1,2}} \frac{\cos z}{z^2 - \pi^2} dz$, $c_1: |z+2| = 2$, $c_2: |z-1.5| = 2$,

d) $\oint_c \frac{z^2 + 3z - 1}{z^2 + z - 2} dz$, $c: |z-i| = 3$,

e) $\oint_c z^2 + \frac{e^z}{z^2} dz$, $c: |z| = \pi$,

f) $\oint_c \frac{\ln z}{(z-1-i)^5} dz$, $c: |z-1-2i| = 2$.

Aufgabe 19:

a) Man berechne die Taylorreihe von $F(z) = \int_1^z \frac{d\xi}{5 - 3\xi}$ zum Entwicklungspunkt $z_0 = 1$ und bestimme den Konvergenzradius.

b) Man bestimme die Konvergenzradien der Taylor-Reihen folgender Funktionen zu den angegebenen Entwicklungspunkten z_0 , ohne die Reihen selbst zu berechnen:

(i) $f(z) = \frac{5z}{z^2 - 2z + 2}$, $z_0 = -1$ und $z_0 = -1 - i$,

(ii) $f(z) = \frac{1}{\cosh z}$, $z_0 = \frac{7i}{2}$,

(iii) $f(z) = \ln(3z + 5)$, $z_0 = 0$ und $z_0 = i$.

Aufgabe 20:

Man gebe alle Potenzreihenentwicklungen der Funktion

$$f(z) = \frac{2z}{z^2 - 1}$$

zum Entwicklungspunkt

a) $z_0 = 2$ und b) $z_0 = -1$

mit Konvergenzbereich an.

Aufgabe 21:

Man bestimme die Laurententwicklung der folgenden Funktionen und gebe jeweils den Koeffizienten a_{-1} der Reihe an:

a) $f(z) = \frac{e^z - 1 - z - z^2/2}{z^2}$ im Punkt $z_0 = 0$,

b) $f(z) = z \sin\left(\frac{1}{z + \pi}\right)$ im Punkt $z_0 = -\pi$,

c) $f(z) = \frac{\cos z}{z^5}$ im Punkt $z_0 = 0$.

Aufgabe 22:

Für die folgenden Funktionen

a) $f(z) = \frac{1}{z^4 + z^2},$

b) $f(z) = \sin \frac{1}{z},$

c) $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^2},$

d) $f(z) = \coth z$

bestimme man:

Lage und Art der (endlichen) Singularitäten, die zugehörigen Residuen und die ersten drei (nichtverschwindenden) Summanden der Laurentreihe um $z_0 = 0$, die für große z konvergiert.

Aufgabe 23:

Gegeben sei die Funktion

$$f(z) = \frac{25}{z^4 - z^2 - 2z + 2}.$$

- a) Man bestimme mit Hilfe von Laurent-Reihenentwicklungen die Partialbruchzerlegung von f .
- b) Man berechne mit Hilfe des Residuensatzes das Integral

$$\oint_c f(z) dz$$

für den Kreis $c: |z + 2| = 2$.**Aufgabe 24:**

Man berechne mit Hilfe des Residuenkalküls die Integrale

a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 6} dx,$

b) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^4 + 324} dx$ und

c)
$$\int_{-2}^{\infty} \frac{x-1}{(x^2+3x-4)\sqrt{x+2}} dx,$$

d)
$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin \varphi}{4 + \cos \varphi} d\varphi.$$

Lösung 1:

$$\begin{aligned} \text{a) } z_1 &= \frac{(1+2i)^2}{2-i} = \frac{(-3+4i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{-10+5i}{5} = -2+i \\ &\Rightarrow \operatorname{Re}(z_1) = -2, \quad \operatorname{Im}(z_1) = 1 \\ |z_1| &= \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \quad \arg(z_1) = \pi + \arctan\left(-\frac{1}{2}\right), \\ z_1 &= \sqrt{5}e^{i(\pi - \arctan(\frac{1}{2}))}, \\ z_2 &= \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \operatorname{Re}(z_2) = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{Im}(z_2) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ |z_2| &= 1, \quad \arg(z_2) = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}, \quad z_2 = e^{\pi i/3} \end{aligned}$$

$$\text{b) } z_2^6 = (e^{\pi i/3})^6 = e^{6\pi i/3} = e^{2\pi i} = 1$$

$$\text{c) } (w + z_2)^3 = 1 = 1e^0$$

$$\Rightarrow w_k = 1^{1/3} e^{(0+2\pi k)i/3} - z_2, \quad k = 0, 1, 2$$

$$w_0 = 1 - z_2 = 1 - \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = \frac{1-i\sqrt{3}}{2},$$

$$w_1 = e^{2\pi i/3} - z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} - \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = -1,$$

$$w_2 = e^{4\pi i/3} - z_2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} - \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = -1 - i\sqrt{3}.$$

Lösung 2

$$\text{a) } |w + z_2|^3 = |8i| = 8 \Leftrightarrow |w + z_2| = 2$$

Mit der kartesischen Darstellung $w = u + iv$ erhält man:

$$\begin{aligned} |w + z_2| &= |u + iv + \sqrt{3} - i| = |u + \sqrt{3} + i(v-1)| \\ &= \sqrt{(u + \sqrt{3})^2 + (v-1)^2} = 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (u + \sqrt{3})^2 + (v-1)^2 = 2^2$$

Die Punktmenge ist ein Kreis mit Mittelpunkt $(-\sqrt{3}, 1)$ und Radius 2.

b) Mit der kartesischen Darstellung $z = x + iy$ erhält man:

$$|\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| = |x| + |y| = \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_1 \leq \sqrt{2}$$

Die Punktmenge ist ein Quadrat mit Kantenlänge 2 und den Eckpunkten $(\sqrt{2}, 0)$, $(0, \sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, 0)$ und $(0, -\sqrt{2})$ im \mathbb{R}^2 bzw. $\sqrt{2}$, $i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ und $-i\sqrt{2}$ in \mathbb{C} .

$$\begin{aligned}
 \text{c)} \quad 36 &= 9\operatorname{Re}(z^2) + 13\operatorname{Im}(z)^2 = 9\operatorname{Re}((x + iy)^2) + 13(\operatorname{Im}(x + iy))^2 \\
 &= 9\operatorname{Re}(x^2 - y^2 + i2xy) + 13y^2 = 9(x^2 - y^2) + 13y^2 \\
 &= 9x^2 + 4y^2
 \end{aligned}$$

Die Punktmenge wird also durch folgende Ellipse beschrieben:

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1.$$

$$\text{d)} \quad \arg(zi) = \arg(re^{i\varphi}e^{i\pi/2}) = \arg(re^{i(\varphi+\pi/2)}) = \varphi + \pi/2 \Rightarrow \pi < \varphi < 3\pi/2$$

Damit ist die Punktmenge gegeben durch den 3. Quadranten ohne die berandenden Achsen.

Lösung 3:

Wenn z_n konvergiert, so gilt mit $z^* := \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1}$:

$$z^* = \frac{i}{2}(2 - i + z^*) \Rightarrow z^* \left(1 - \frac{i}{2}\right) = \frac{(2 - i)i}{2} \Rightarrow z^* = i.$$

z_n konvergiert, da

$$\begin{aligned}
 |z_{n+1} - i| &= \left| \frac{i}{2}(2 - i + z_n) - i \right| = \left| \frac{i}{2} \left| 2 - i + z_n - \frac{i}{2} \right| \right| = \frac{1}{2} |z_n - i| \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 |z_{n-1} - i| = \dots = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |z_0 - i| = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned}$$

Lösung 4:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z^* \Leftrightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z^*| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\operatorname{Re}(z_n - z^*)^2 + \operatorname{Im}(z_n - z^*)^2}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n - z^*) = 0 \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n - z^*) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z^*) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z^*)$$

Lösung 5:

a)




Bild 5.a.1) $Q := \{z \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1, 0 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$

Die Abbildung $f(z) = iz^2 + 2$ wird interpretiert als Hintereinanderausführung $f = f_3 \circ f_2 \circ f_1$ mit $f_1(z) = z^2$, $f_2(u) = iu$ und $f_3(v) = v + 2$.




Bild 5.a.2) $f_1(Q)$

Mit der Funktion $f_1(z) = z^2$ werden die Ränder von Q folgendermaßen abgebildet:

- (i) $c_1(x) = x$ mit $x \in [0, 1]$: $f_1(c_1(x)) = x^2$,
damit wird das Intervall $[0, 1]$ in sich abgebildet.
- (ii) $c_2(y) = 1 + iy$ mit $y \in [0, 1] \Rightarrow f_1(c_2(y)) = (1 + iy)^2 = 1 - y^2 + i2y$
(nach unten geöffnete Parabel bzgl. der y -Achse)
- (iii) $c_3(x) = x + i$ mit $x \in [0, 1] \Rightarrow f_1(c_3(x)) = (x + i)^2 = x^2 - 1 + i2x$
(nach oben geöffnete Parabel bzgl. der y -Achse)
- (iv) $c_4(y) = iy$ mit $y \in [0, 1]$: $f_1(c_4(y)) = (iy)^2 = -y^2$,
damit ist das Bild von c_4 das Intervall $[-1, 0]$.




Bild 5.a.3) $f_2(f_1(Q))$

Die Funktion $f_2(u) = iu$ bewirkt eine Drehung um den Winkel $\varphi = \frac{\pi}{2}$




Bild 5.a.4) $f(Q) = f_3(f_2(f_1(Q)))$

Die Funktion $f_3(v) = v + 2$ bewirkt eine Verschiebung in Richtung der positiven x -Achse um den Wert 2.

$$b) \exp(z_1) = \exp\left(3 + \frac{\pi i}{4}\right) = e^3 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{e^3\sqrt{2}}{2} + i\frac{e^3\sqrt{2}}{2}$$

$$\exp(z_2) = \exp\left(1 - \frac{\pi i}{2}\right) = e \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = -ie$$

$$\begin{aligned} \exp(z_1 + z_2) &= \exp\left(4 - \frac{\pi i}{4}\right) = e^4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) \\ &= \frac{e^4\sqrt{2}}{2} - i\frac{e^4\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Damit erhält man

$$\exp(z_1) \exp(z_2) = \left(\frac{e^3\sqrt{2}}{2} + i\frac{e^3\sqrt{2}}{2}\right) (-ie) = \frac{e^4\sqrt{2}}{2} - i\frac{e^4\sqrt{2}}{2} = \exp(z_1 + z_2).$$

Lösung 6:

a) Der Hauptwert $\ln z$ des Logarithmus ist definiert für $-\pi < \arg z < \pi$ durch

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z.$$

$$\ln(z_1) = \ln(-i) = \ln |-i| + i \arg(-i) = \ln 1 - i\pi/2 = -i\pi/2$$

$$\ln(z_2) = \ln(-2i) = \ln |-2i| + i \arg(-2i) = \ln 2 - i\pi/2$$

$$z_1 z_2 = -i(-2i) = -2 = 2e^{-\pi i}$$

Damit liegt $z_1 z_2$ nicht im Definitionsbereich des Hauptwertes und $\ln(z_1 z_2) = \ln(-2)$ kann nicht berechnet werden.

b) Mit $z = x + iy$ gilt:

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) = -\frac{i}{2} (e^{-y+ix} - e^{y-ix}) \\ &= \frac{1}{2} (-ie^{-y}(\cos x + i \sin x) + ie^y(\cos x - i \sin x)) \\ &= \frac{1}{2} (\sin x(e^y + e^{-y}) + i \cos x(-e^{-y} + e^y)) \\ &= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \end{aligned}$$

$$2 = \sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \quad \Rightarrow \quad \cos x \sinh y = 0$$

1. Fall: $\sinh y = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow \sin x \cosh 0 = \sin x = 2$
besitzt keine Lösung.

2. Fall: $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) \cosh y = (-1)^k \cosh y = 2$$

$$\Rightarrow \cosh y = 2 \text{ und } k = 2n \Rightarrow y = \pm \operatorname{arcosh} 2$$

$$\Rightarrow z_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \pm i \operatorname{arcosh} 2, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Lösung 7:

- a) (i) Mit der Polardarstellung $z = 3e^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ auf dem Kreis $|z| = 3$ erhält man:

$$f(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{3e^{i\varphi}}{3} + \frac{3}{3e^{i\varphi}} \right) = \frac{1}{2}(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) = \cos \varphi \in [-1, 1].$$

- (ii) Die Polardarstellung $z = re^{i\pi/4}$, $0 < r < \infty$ des Halbstrahls $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z) > 0$ ergibt:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{re^{i\pi/4}}{3} + \frac{3}{re^{i\pi/4}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{r}{3}(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4) + \frac{3}{r}(\cos \pi/4 - i \sin \pi/4) \right) \\ &= \underbrace{\left(\frac{r}{6} + \frac{3}{2r} \right) \cos \pi/4}_{=u} + i \underbrace{\left(\frac{r}{6} - \frac{3}{2r} \right) \sin \pi/4}_{=v}. \end{aligned}$$

$u = \operatorname{Re}(f)$ und $v = \operatorname{Im}(f)$ erfüllen die Hyperbelgleichung

$$\frac{u^2}{\cos^2 \pi/4} - \frac{v^2}{\sin^2 \pi/4} = \left(\frac{r}{6} + \frac{3}{2r} \right)^2 - \left(\frac{r}{6} - \frac{3}{2r} \right)^2 = 1.$$

Mathematica Plot-Befehl

```
ParametricPlot[{Sqrt[2] Cosh[t]/2,
Sqrt[2] Sinh[t]/2}, {t, -2.1, 2.1},
AxesLabel -> {"Re", "Im"}, PlotRange -> {-3, 3}]
```

Mit

$$\cosh(t) = \left(\frac{r}{6} + \frac{3}{2r} \right), \quad \sinh(t) = \left(\frac{r}{6} - \frac{3}{2r} \right)$$

entspricht der Radius $r = 3$ dem Wert $t = 0$.




Bild 7 a)(ii): Hyperbel

- (iii) Aus der Polardarstellung $z = re^{i\pi/2} = ir$, $0 < r < \infty$ des Halbstrahls $\operatorname{Re}(z) = 0$, $\operatorname{Im}(z) > 0$ folgt:

$$f(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{ir}{3} + \frac{3}{ir} \right) = i \underbrace{\left(\frac{r}{6} - \frac{3}{2r} \right)}_{=t} \quad \text{mit } t \in \mathbb{R}.$$

Die Polardarstellung führt im Bild also auf die imaginäre Achse.

- b) Die Joukowski-Funktion ist nicht bijektiv, denn es gilt $f\left(\frac{9}{z}\right) = f(z)$.

Die Umkehrfunktion von f ergibt sich durch Auflösen von $w = f(z)$ nach z :

$$\begin{aligned} w &= \frac{1}{2} \left(\frac{z}{3} + \frac{3}{z} \right) \Rightarrow 6wz = z^2 + 9 \\ \Rightarrow z^2 - 6wz + 9 &= (z - 3w)^2 - 9w^2 + 9 = 0 \Rightarrow (z - 3w)^2 = 9(w^2 - 1) \\ \Rightarrow z &= f^{-1}(w) = 3(w + \sqrt{w^2 - 1}) \end{aligned}$$

Für $\sqrt{w^2 - 1}$ ist dabei der Zweig zu wählen, für den $|z| > 3$ gilt.

Lösung 8:

Die Umkehrabbildung der Inversion $w = f(z) = \frac{1}{z}$ lautet

$$z = f^{-1}(w) = \frac{1}{w},$$

wobei $z \neq 0$ und $w \neq 0$. Damit ergeben sich folgende Bilder

$$\begin{aligned} \text{a) } -1 &= \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{\bar{w}} \right) \Leftrightarrow 2w\bar{w} + w + \bar{w} = 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{4} &= w\bar{w} + \frac{1}{2}w + \frac{1}{2}\bar{w} + \frac{1}{4} \Leftrightarrow \left(w + \frac{1}{2} \right) \left(\bar{w} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow \left| w + \frac{1}{2} \right| &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Bild von $\operatorname{Re}(z) = -1$ ist der Kreis um $w_0 = -\frac{1}{2}$ mit Radius $r = \frac{1}{2}$.

- b) $\operatorname{Im}(z) > 0 \wedge \operatorname{Re}(z) = 0 \Leftrightarrow z = iy$ und $y > 0$

$$\Leftrightarrow w = \frac{1}{z} = \frac{1}{iy} = -\frac{i}{y}$$

Der Strahl wird auf den Strahl $\operatorname{Im}(z) < 0 \wedge \operatorname{Re}(z) = 0$ abgebildet und umgekehrt durchlaufen.

$$c) \quad 4 = |z| = \left| \frac{1}{w} \right| \Leftrightarrow |w| = \frac{1}{4}.$$

Der Ursprungskreis vom Radius 4 wird in den Ursprungskreis vom Radius $\frac{1}{4}$ abgebildet.

$$d) \quad |z - 1| = 1 \Leftrightarrow 1 = z\bar{z} - z - \bar{z} + 1 = \frac{1}{w} \frac{1}{\bar{w}} - \frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} + 1$$

$$\Leftrightarrow w + \bar{w} = 1 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(w) = \frac{1}{2}.$$

Das Bild des Kreises ist die Gerade $\operatorname{Re}(w) = \frac{1}{2}$.

$$e) \quad |z - 1| = 3 \Leftrightarrow 9 = z\bar{z} - z - \bar{z} + 1 = \frac{1}{w} \frac{1}{\bar{w}} - \frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} + 1$$

$$\Leftrightarrow w\bar{w} + \frac{1}{8}\bar{w} + \frac{1}{8}w + \frac{1}{64} = \frac{1}{64} + \frac{1}{8} = \frac{9}{64} \Leftrightarrow \left| w + \frac{1}{8} \right| = \frac{3}{8}.$$

Das Bild des Kreises ist der Kreis um $w_0 = -\frac{1}{8}$ mit Radius $r = \frac{3}{8}$.

Lösung 9:

a) Ein Vergleich mit der Standardform $T(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ ergibt

$$ad = 2(1+i)(-1-i) = -4i \neq 0 = 0 \cdot 1 = bc,$$

d.h. T ist eine Möbius Transformation.

b) $z = \frac{2(1+i)z}{z-1-i} \stackrel{z \neq 1+i}{\Leftrightarrow} z(z-1-i) = 2(1+i)z \Leftrightarrow z(z-3(1+i)) = 0$

Man erhält also die beiden Fixpunkte $z_1 = 0$ und $z_2 = 3(1+i) = 3\sqrt{2}e^{i\pi/4}$.

c) Die Punkte z_1, z_2 und $1+i$ liegen auf der Winkelhalbierenden, also einer Geraden. Daher liegen sie im Bild unter T auf einer Geraden oder einem Kreis. Da z_1 und z_2 Fixpunkte sind und $T(1+i) = \infty$ gilt, wird die Winkelhalbierende auf sich selbst abgebildet.

d) Die oberhalb der Winkelhalbierenden liegende Ebene wird wegen Teil c), $T(i) = 2 - 2i$ und weil T stetig ist auf die unterhalb der Winkelhalbierenden liegende Ebene abgebildet.

e) Durch Auflösen von $w = \frac{2(1+i)z}{z-1-i}$ nach z erhält man die Umkehrabbildung:

$$w = \frac{2(1+i)z}{z-1-i} \stackrel{z \neq 1+i}{\Leftrightarrow} w(z-1-i) = 2(1+i)z$$

$$\Leftrightarrow z(w - 2(1+i)) = (1+i)w \stackrel{z \neq 2(1+i)}{\Leftrightarrow} z = T^{-1}(w) = \frac{(1+i)w}{w - 2(1+i)}$$

Lösung 10:

a) Einsetzen in die Dreipunkteformel und Auflösen nach w ergibt:

$$\begin{aligned} \frac{w-0}{w-4} : \frac{2+2i-0}{2+2i-4} &= \frac{z-0}{z+2} : \frac{i-1-0}{i-1+2} \Leftrightarrow \frac{w}{w-4} : \frac{i+1}{i-1} = \frac{z}{z+2} : \frac{i-1}{i+1} \\ \Rightarrow w(z+2) &= z(w-4) \underbrace{\frac{(i+1)^2}{(i-1)^2}}_{=-1} \Leftrightarrow wz + 2w = 4z - wz \Leftrightarrow w = \frac{2z}{z+1} =: T(z). \end{aligned}$$

b) Eine Probe ergibt, dass z_0, \dots, z_3 auf dem Kreis $|z+1|=1$ liegen.

Alternativ und ohne Kenntnis des Kreises kann man auch nachprüfen, dass das Doppelverhältnis reell ist:

$$\frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = \frac{-1-i}{-1-i+2} : \frac{i-1}{i-1+2} = \frac{(-1-i)(1+i)}{(1-i)(i-1)} = -1 \in \mathbb{R}$$

c) Die Punkte $z_1 = 0$, $z_2 = -2$ und $z_3 = i-1$ liegen auf dem Kreis K . Damit liegen die Punkte $T(z_1) = 0$, $T(z_2) = 4$ und $T(z_3) = 2+2i$ auf dem Bildkreis $T(K)$.




Bild 10: z_1, z_2, z_3 und K

w_1, w_2, w_3 und $T(K)$

Lösung 11:

Die Lösungsidee besteht darin, dass der die Kreisscheibe berandende Kreis

$$K := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1 - i| = 1\}$$

durch T auf die Winkelhalbierende $\text{Im}(w) = \text{Re}(w)$ abgebildet wird.

$z_2 = i$ liegt auf dem Kreis K .

Da $T(i) = w_2 = 0$ gilt, ist der Bildkreis $T(K)$ ein Kreis durch den Nullpunkt.

Der Mittelpunkt $z_1 = 1 + i$ von K wird auf $w_1 = -1 + i$ abgebildet. Der bezüglich K zu z_1 symmetrische Punkt $z_3 = \infty$ wird auf den zur Winkelhalbierenden symmetrischen Punkt $w_3 = 1 - i$ abgebildet.

Damit wird der Kreis $|z - 1 - i| = 1$ auf die Winkelhalbierende abgebildet.

Die Möbius-Transformation $w = T(z)$ ergibt sich dann aus der Dreipunkteformel

$$\frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = \frac{w - w_1}{w - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2}.$$

Man erhält

$$\left. \frac{z - (1 + i)}{z - i} : \frac{z_3 - (1 + i)}{z_3 - i} \right|_{z_3 \rightarrow \infty} = \frac{w - (-1 + i)}{w - 0} : \frac{1 - i - (-1 + i)}{1 - i - 0}$$

$$\Rightarrow \frac{z - 1 - i}{z - i} = \frac{w + 1 - i}{2w} \Rightarrow w = T(z) = \frac{(1 - i)(z - i)}{z - 2 - i}$$




Bild 11 a): K mit z_1 und z_2 **Bild 11 b):** $T(K)$ mit w_1, w_2 und w_3

Da $z_1 = 1 + i$ auf $w_1 = -1 + i$ oberhalb der Winkelhalbierenden abgebildet wird, ist aus Stetigkeitsgründen das Bild der Kreisscheibe $|z - 1 - i| \leq 1$ die Halbebene oberhalb der Winkelhalbierenden.

Lösung 12:

f besitzt folgende Zerlegung in Real- und Imaginärteil

$$f(z_0) = z_0^2 = (x_0 + iy_0)^2 = x_0^2 - y_0^2 + i2x_0y_0 = f(x_0, y_0).$$

Man erhält

$$f_x(z_0) = f_x(x_0, y_0) = 2x_0 + i2y_0, \quad f_y(z_0) = f_y(x_0, y_0) = -2y_0 + i2x_0$$

$$\text{a) } A = \frac{1}{2} (f_x(z_0) - if_y(z_0)) = \frac{1}{2} (2x_0 + i2y_0 - i(-2y_0 + i2x_0)) = 2x_0 + i2y_0 = 2z_0$$

Durch rein formales Differenzieren wie im Reellen erhält man $\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = 2z_0$.

$$b) B = \frac{1}{2} (f_x(z_0) + if_y(z_0)) = \frac{1}{2} (2x_0 + i2y_0 + i(-2y_0 + i2x_0)) = 0$$

Durch rein formales Differenzieren wie im Reellen erhält man $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$.

Lösung 13:

$$a) \quad (i) \quad f(z) = z \cdot \operatorname{Im}(z) = (x + iy)y = \underbrace{xy}_{=u(x,y)} + i \underbrace{y^2}_{=v(x,y)}$$

Wegen $u_x = y \neq 2y = v_y$ sind die Cauchy-Riemannsches Differentialgleichungen nicht erfüllt und f ist nicht holomorph.

(ii) Mit $z = x + iy$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} g(z) &= 2z + 2\bar{z} + 4i\operatorname{Im}z - 3i \\ &= 2(x + iy) + 2(x - iy) + 4iy - 3i = 4x + i(4y - 3) \end{aligned}$$

Da $\operatorname{Re} g(z) = 4x =: u(x, y)$ und

$\operatorname{Im} g(z) = 4y - 3 =: v(x, y)$ stetig partiell differenzierbar sind und die Cauchy-Riemannsches Differentialgleichungen erfüllen

$$u_x = 4 = v_y, \quad v_x = 0 = -u_y$$

ist g holomorph.

$$\begin{aligned} (iii) \quad \Delta u(x, y) &= (x^3 - 3xy^2 - 6xy - 3x^2)_{xx} + (x^3 - 3xy^2 - 6xy - 3x^2)_{yy} \\ &= 6x - 6 - 6x = -6 \end{aligned}$$

Damit ist u nicht harmonisch.

$$b) \quad \Delta u = (4x^2 - 4y^2 - 12x + 9)_{xx} + (4x^2 - 4y^2 - 12x + 9)_{yy} = 8 - 8 = 0$$

Damit $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ holomorph in \mathbb{C} ist, müssen die Cauchy-Riemannsches Differentialgleichungen erfüllt sein:

$$v_y = u_x = 8x - 12 \quad \Rightarrow \quad v = 8xy - 12y + c(x)$$

$$v_x = 8y + c'(x) = -u_y = -(-8y)$$

$$\Rightarrow \quad c'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad c(x) = c \in \mathbb{R}$$

Da $v(x, y) = 8xy - 12y + c$ (und auch u) stetig partiell differenzierbar ist, ist f holomorph in \mathbb{C} und v eine (die) konjugiert harmonische Funktion zu u .

Bemerkung:

Für $f(z) = (2z - 3)^2$ und $c = 0$ ergibt sich $u(x, y) = \operatorname{Re} f$ und $v(x, y) = \operatorname{Im} f$.

Lösung 14:

Der Hauptwert der Wurzelfunktion für $z = re^{i\varphi}$ ist festgelegt durch

$$w = \sqrt{z} := \sqrt{r}e^{i\varphi/2} \quad \text{mit} \quad -\pi < \varphi < \pi.$$

a) $c_1(t) = t$ für $t > 0$: positive reelle Achse

$$c_2(t) = 4e^{it} \text{ für } -\pi < t < \pi:$$

Kreis vom Radius $r = 4$ ohne den Punkt $z = -4$.

$$\text{Schnittpunkt } z_s \text{ von } c_1 \text{ und } c_2: \quad c_1(4) = 4 = z_s = c_2(0)$$




Bild 14 a): $c_1(t)$, $c_2(t)$ und Schnittpunkt $z_s = 4$ in der z -Ebene

Ableitungen der Kurven in den Schnittpunkten:

$$\dot{c}_1(t) = 1 \Rightarrow \dot{c}_1(4) = 1 = 1e^{i \cdot 0} \text{ und}$$

$$\dot{c}_2(t) = 4ie^{it} \Rightarrow \dot{c}_2(0) = 4i = 4e^{i\pi/2}$$

Schnittwinkel:

$$\begin{aligned} \gamma &= \angle(\dot{c}_2(0), \dot{c}_1(4)) = \arg \dot{c}_2(0) - \arg \dot{c}_1(4) \\ &= \arg(4i) - \arg 1 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

b) Für die Bildkurven erhält man:

$$d_1(t) := \sqrt{c_1(t)} = \sqrt{t} \text{ mit } t > 0: \text{ positive reelle Achse}$$

$$d_2(t) := \sqrt{c_2(t)} = 2e^{it/2} \text{ für } -\pi < t < \pi:$$

Halbkreis vom Radius $r = 2$ in der rechten Halbebene (ohne die Punkte $w = \pm 2i$).

$$\text{Schnittpunkt: } d_1(4) = 2 = d_2(0)$$




Bild 14 b): $d_1(t)$, $d_2(t)$ und Schnittpunkt $w_s = \sqrt{z_s} = 2$ in der w -Ebene
 Ableitungen der Bildkurven in den Schnittpunkten:

$$\dot{d}_1(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \Rightarrow \dot{d}_1(4) = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}e^{i \cdot 0} \text{ und}$$

$$\dot{d}_2(t) = ie^{it/2} \Rightarrow \dot{d}_2(0) = i = e^{i\pi/2}$$

Schnittwinkel:

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma} &= \angle \left(\dot{d}_2(0), \dot{d}_1(4) \right) = \arg \dot{d}_2(0) - \arg \dot{d}_1(4) \\ &= \arg(i) - \arg 1/4 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{lokales Längenverhältnis: } \frac{|\dot{c}_2(0)|}{|\dot{c}_1(4)|} = \frac{|4i|}{|1|} = 4 = \frac{|i|}{|1/4|} = \frac{|\dot{d}_2(0)|}{|\dot{d}_1(4)|}$$

Bemerkung:

Der Streckungsfaktor $f'(c(t))$, der in

$$\dot{d}(t) = \frac{d}{dt} (f(c(t))) = f'(c(t))\dot{c}(t)$$

steckt, kürzt sich im Schnittpunkt heraus.

Der Schnittwinkel und das lokale Längenverhältnis bleiben erhalten, da die Kurven im Holomorphiegebiet von \sqrt{z} verlaufen und dort $f'(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}} \neq 0$ gilt.

Lösung 15:

a)




Bild 15 a): Kreise K_1 und K_2

Symmetrie zu $K_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 3\}$ und

$K_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = 1\}$ liefert die Bedingungen

$$\begin{aligned} z_1 \bar{z}_2 &= 3^2 \Rightarrow \bar{z}_2 = \frac{9}{z_1} \\ (z_1 - 1)(\bar{z}_2 - 1) &= 1^2 \Rightarrow (z_1 - 1) \left(\frac{9}{z_1} - 1 \right) = 1 \\ \Rightarrow z_1^2 - 9z_1 + 9 &= 0 \\ \Rightarrow z_1 &= \frac{9 \pm 3\sqrt{5}}{2} \Rightarrow z_2 = \frac{9}{\bar{z}_1} = \frac{9 \mp 3\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

b) Mit $T(z) = k \cdot \frac{z - z_1}{z - z_2}$ und $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ gilt $w_1 = T(z_1) = 0$ und $w_2 = T(z_2) = \infty$.

T ist eine Möbius-Transformation wegen $k \neq 0$,
denn $ad - bc = k(z_1 - z_2) \neq 0$.

T ist holomorph für $z \in \mathbb{C} \setminus \{z_2\}$ und deshalb auch konform in diesem Gebiet, da $T'(z) = \frac{ad - bc}{(z - z_2)^2} \neq 0$ gilt.

c) Da z_1 und z_2 symmetrisch zu K_1 und K_2 liegen, liegen auch $w_1 = 0$ und $w_2 = \infty$ symmetrisch zu den Bildkreisen $T(K_1)$ und $T(K_2)$. Da z_2 nicht auf $K_{1,2}$ liegt, liegt $w_2 = \infty$ nicht auf den Bildern. Damit müssen $T(K_1)$ und $T(K_2)$ Kreise um den Ursprung sein.

Da $z_3 = 0$ auf K_1 liegt, wird K_1 wegen $T(0) = 1$ auf den Einheitskreis abgebildet.

Aus $T(0) = 1 = k \cdot \frac{0 - z_1}{0 - z_2} = k \cdot \frac{z_1}{z_2}$ folgt $k = \frac{z_2}{z_1}$ und

$$T(z) = \frac{z_2(z - z_1)}{z_1(z - z_2)} = \frac{z_2 z - z_2 z_1}{z_1 z - z_1 z_2} = \frac{z_2 z - 9}{z_1 z - 9}$$

Der Radius R von $T(K_2)$ kann, da $z_4 = 3$ auf K_2 liegt, durch $R = |T(3)|$ bestimmt werden.

Konkret ergibt sich für $z_1 = \frac{9-3\sqrt{5}}{2} \approx 1.15$

$$R = \left| \frac{3 \cdot \frac{9+3\sqrt{5}}{2} - 9}{3 \cdot \frac{9-3\sqrt{5}}{2} - 9} \right| = \left| \frac{1 + \sqrt{5}}{1 - \sqrt{5}} \right| \approx 2.618$$




Bild 15 c): Kreise $T(K_1)$ und $T(K_2)$ mit $z_1 = \frac{9-3\sqrt{5}}{2} \approx 1.15$

Da z_1 im Inneren von K_1 liegt, wird das beschränkte zwischen den beiden Kreisen liegende Gebiet abgebildet auf den Kreisring

$$\{w \in \mathbb{C} \mid 1 < |w| < R = 2.618\}.$$

Im umgekehrten Fall, d.h. $z_1 = \frac{9+3\sqrt{5}}{2} \approx 7.85$, erhält man den Kreisring

$$\{w \in \mathbb{C} \mid R = 0.38 < |w| < 1\}.$$

Lösung 16:




Bild 16 a): Gebiet D

Gesucht ist die reellwertige Funktion $u : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ für die mit $z = x + iy$ gilt

$$\begin{aligned}\Delta u(x, y) &= 0 && \text{für alle } (x, y)^T \in D \\ u(x, y) &= 2 && \text{für alle } (x, y)^T \in K_2 \\ u(x, y) &= 1 && \text{für alle } (x, y)^T \in K_1.\end{aligned}$$

Das Gebiet D wird jetzt durch die konforme Möbius-Transformation T aus Aufgabe 11 auf einen der Kreisringe, z.B. $T(D) = \{w \in \mathbb{C} \mid 1 < |w| < R = 2.618\}$ abgebildet.

Die konform verpflanzte Funktion lautet mit $T(z) = w = \xi + i\eta$

$$U(\xi, \eta) = U(w) := u(T^{-1}(w)) = u(z)$$

und erfüllt wegen des zweiten konformen Verpflanzungssatzes:

$\Delta u = \Delta U \cdot |T'(z)|^2$ und $T'(z) \neq 0$ das Randwertproblem

$$\begin{aligned}\Delta U(\xi, \eta) &= 0 && \text{für alle } (\xi, \eta)^T \in T(D) \\ U(\xi, \eta) &= 2 && \text{für alle } (\xi, \eta)^T \in T(K_2) \\ U(\xi, \eta) &= 1 && \text{für alle } (\xi, \eta)^T \in T(K_1).\end{aligned}$$

Dieses Problem im Kreisring $T(D)$ lässt sich besser in Polarkoordinaten lösen, deshalb wird erneut mit $\xi = r \cos \varphi$, $\eta = r \sin \varphi$, $1 \leq r \leq R$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ und $v(r, \varphi) := U(\xi(r, \varphi), \eta(r, \varphi))$ transformiert und das Problem lautet jetzt

$$\begin{aligned}v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\varphi\varphi} &= 0 && \text{für alle } 1 \leq r \leq R, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi \\ v(R, \varphi) &= 2, && 0 \leq \varphi < 2\pi \\ v(1, \varphi) &= 1.\end{aligned}$$




Bild 16 b): $T(D) = \{w \in \mathbb{C} \mid 1 < |w| < R = 2.618\}$ mit $z_1 = \frac{9-3\sqrt{5}}{2} \approx 1.15$

Auf Grund der Gebietssymmetrie und der Rotationssymmetrie der Randdaten liegt die Vermutung nahe, dass dieses Problem eine rotationssymmetrische Lösung besitzt, d.h. $v(r, \varphi) = v(r)$. Das Problem vereinfacht sich so zu einer Randwertaufgabe mit gewöhnlicher Differentialgleichung

$$\begin{aligned}v_{rr} + \frac{1}{r}v_r &= 0 \quad \text{für alle } 1 < r < R \\v(R) &= 2, \\v(1) &= 1,\end{aligned}$$

deren allgemeine Lösung lautet $v(r) = c_1 \ln r + c_2$.

Anpassen an die Randdaten liefert

$$1 = v(1) = c_1 \ln 1 + c_2 = c_2 \quad \text{und} \quad 2 = v(R) = c_1 \ln R + 1 \\ \Rightarrow c_1 = 1/\ln R.$$

Die gesuchte Lösung in Polarkoordinaten lautet somit

$$v(r, \varphi) = v(r) = \frac{\ln r}{\ln R} + 1.$$

Rücktransformation in die w -Ebene ergibt dort die Lösung

$$U(w) = \frac{\ln |w|}{\ln R} + 1.$$

Rücktransformation in die z -Ebene ergibt dort die Lösung

$$u(z) = \frac{\ln |T(z)|}{\ln R} + 1.$$

Mit (beachte $z_{1,2} \in \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned}|T(z)| &= \left| \frac{z_2 z - 9}{z_1 z - 9} \right| = \left(\frac{z_2 z \bar{z}_2 \bar{z} - 9(z_2 z + \bar{z}_2 \bar{z}) + 81}{z_1 z \bar{z}_1 \bar{z} - 9(z_1 z + \bar{z}_1 \bar{z}) + 81} \right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{z_2^2 z \bar{z} - 9z_2(z + \bar{z}) + 81}{z_1^2 z \bar{z} - 9z_1(z + \bar{z}) + 81} \right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{z_2^2(x^2 + y^2) - 18z_2 x + 81}{z_1^2(x^2 + y^2) - 18z_1 x + 81} \right)^{1/2}\end{aligned}$$

ergibt sich in der (x, y) -Ebene die Lösungsdarstellung

$$u(x, y) = \frac{1}{2 \ln R} \ln \left(\frac{z_2^2(x^2 + y^2) - 18z_2 x + 81}{z_1^2(x^2 + y^2) - 18z_1 x + 81} \right) + 1.$$




Bild 16 c): Höhenlinien der Lösung $u(x, y)$

Lösung 17:

a) direkt:

Kurvenparametrisierung: $c(t) = 2it + 1 - i, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \Rightarrow \quad \dot{c}(t) = 2i$

$$\begin{aligned} \int_c z^3 + 4 dz &= \int_0^1 ((c(t))^3 + 4)\dot{c}(t) dt = \int_0^1 ((2it + 1 - i)^3 + 4)2i dt \\ &= \int_0^1 (-8it^3 - 12(1 - i)t^2 + 12t - 2i - 2 + 4)2i dt \\ &= \int_0^1 16t^3 - 24(1 + i)t^2 + 24it + 4 + 4i dt \\ &= (4t^4 - 8(1 + i)t^3 + 12it^2 + (4 + 4i)t) \Big|_0^1 \\ &= 4 - 8(1 + i) + 12i + (4 + 4i) = 8i \end{aligned}$$

Stammfunktion:

$$\begin{aligned} \int_c z^3 + 4 dz &= \int_{1-i}^{1+i} z^3 + 4 dz = \left(\frac{z^4}{4} + 4z \right) \Big|_{1-i}^{1+i} \\ &= \left(\frac{(1+i)^4}{4} - \frac{(1-i)^4}{4} + 4(1+i - (1-i)) \right) = \frac{-4}{4} - \frac{-4}{4} + 8i = 8i \end{aligned}$$

b) direkt: $c(t) = i\pi t$ mit $-1 \leq t \leq 0$

$$\begin{aligned} \int_c z e^z dz &= \int_{-1}^0 \dot{c}(t)c(t)e^{c(t)} dt = \int_{-1}^0 i\pi i\pi t e^{i\pi t} dt = -\pi^2 \int_{-1}^0 t e^{i\pi t} dt \\ &= -\pi^2 \left(\frac{t e^{i\pi t}}{i\pi} \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{i\pi} \int_{-1}^0 e^{i\pi t} dt \right) = -\pi^2 \left(\frac{t e^{i\pi t}}{i\pi} - \frac{e^{i\pi t}}{(i\pi)^2} \right) \Big|_{-1}^0 \\ &= e^{i\pi t} (i\pi t - 1) \Big|_{-1}^0 = -1 - e^{-i\pi} (-i\pi - 1) \\ &= -1 + (-i\pi - 1) = -2 - i\pi \end{aligned}$$

Stammfunktion:

$$\begin{aligned} \int_c z e^z dz &= \int_{-i\pi}^0 z e^z dz = e^z (z - 1) \Big|_{-i\pi}^0 = -1 - e^{-i\pi} (-i\pi - 1) \\ &= -1 + (-i\pi - 1) = -2 - i\pi \end{aligned}$$

c) (i) $c_1(t) = it$ mit $\pi/4 \leq t \leq 3\pi/4$

direkt:

$$\int_{c_1} \frac{1}{z} dz = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \frac{i}{it} dt = \ln t \Big|_{\pi/4}^{3\pi/4} = \ln \frac{3\pi}{4} - \ln \frac{\pi}{4} = \ln 3$$

Stammfunktion:

$$\int_{c_1} \frac{1}{z} dz = \ln z \Big|_{\pi i/4}^{3\pi i/4} = \ln \left| \frac{3\pi i}{4} \right| + i\frac{\pi}{2} - \left(\ln \left| \frac{\pi i}{4} \right| + i\frac{\pi}{2} \right) = \ln \frac{3\pi}{4} - \ln \frac{\pi}{4} = \ln 3$$

(ii) $c_2(t) = e^{it}$ mit $\pi/4 \leq t \leq 3\pi/4$

direkt:

$$\int_{c_2} \frac{1}{z} dz = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} i dt = it \Big|_{\pi/4}^{3\pi/4} = \frac{\pi i}{2}$$

Stammfunktion:

$$\int_{c_2} \frac{1}{z} dz = \ln z \Big|_{(1+i)/\sqrt{2}}^{(-1+i)/\sqrt{2}} = \ln \left| \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \right| + i\frac{3\pi}{4} - \ln \left| \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right| - i\frac{\pi}{4} = \frac{\pi i}{2}$$

d) direkt: $c(\varphi) = e^{i\varphi}$ mit $0 \leq \varphi \leq \pi/2$

$$\begin{aligned} \int_1^i \ln z dz &= \int_0^{\pi/2} \ln(e^{i\varphi}) i e^{i\varphi} d\varphi = i \int_0^{\pi/2} e^{i\varphi} (\ln |e^{i\varphi}| + i\varphi) d\varphi = - \int_0^{\pi/2} e^{i\varphi} \varphi d\varphi \\ &= \left(-\frac{\varphi}{i} e^{i\varphi} \right) \Big|_0^{\pi/2} + \frac{1}{i} \int_0^{\pi/2} e^{i\varphi} d\varphi = -\frac{\pi}{2} - e^{i\varphi} \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{\pi}{2} - i + 1 \end{aligned}$$

Stammfunktion: In der geschlitzten Ebene $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-^0$ ist $\ln z$ holomorph.

$$\begin{aligned} \int_1^i 1 \cdot \ln z \, dz &= z \ln z \Big|_1^i - \int_1^i z \cdot \frac{1}{z} \, dz = (z (\ln |z| + i \arg z) - z) \Big|_1^i \\ &= i \left(\ln |i| + i \frac{\pi}{2} \right) - (i - 1) = -\frac{\pi}{2} - i + 1 \end{aligned}$$

Lösung 18:

a) Isolierte Singularität bei $z_0 = -2$ wird nicht von $c : |z + 1 - i| = 1$ umschlossen

$$\oint_{|z+1-i|=1} \frac{1}{z+2} \, dz = 0$$




Bild 18 a): Kurve $c : |z + 1 - i| = 1$

b)
$$\frac{z^2 - 2z + 2}{z^3 - z^2 + 2} = \frac{(z - 1 - i)(z - 1 + i)}{(z + 1)(z - 1 - i)(z - 1 + i)} = \frac{1}{z + 1}$$

Isolierte aber hebbare Singularität bei $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$:

Isolierte und nicht hebbare Singularität bei $z_0 = -1$:

z_0 wird von $c_1 : |z| = 0.5$ nicht umschlossen:
$$\oint_{c_1} \frac{1}{z + 1} \, dz = 0$$

z_0 wird von $c_2 : |z| = 1.5$ umschlossen:
$$\oint_{c_2} \frac{1}{z + 1} \, dz = 2\pi i$$




Bild 18 b): Kurven $c_1 : |z| = 0.5$ und $c_2 : |z| = 1.5$

$$c) \frac{\cos z}{z^2 - \pi^2} = \cos z \cdot \frac{1}{z + \pi} \cdot \frac{1}{z - \pi},$$

Singularitäten bei $z_0 = -\pi$ und $z_1 = \pi$

$c_1 : |z + 2| = 2$ umschließt nur die isolierte Singularität $z_0 = -\pi$

$$f(z) = \cos z \cdot \frac{1}{z - \pi} \Rightarrow f(-\pi) = \cos(-\pi) \cdot \frac{1}{-\pi - \pi} = \frac{1}{2\pi}$$

$$\oint_{c_1} \frac{f(z)}{z + \pi} dz = \frac{2\pi i f(-\pi)}{0!} = \frac{2\pi i}{2\pi} = i$$

$c_2 : |z - 1.5| = 2$ umschließt nur die isolierte Singularität $z_1 = \pi$

$$g(z) = \cos z \cdot \frac{1}{z + \pi} \Rightarrow g(\pi) = \cos(\pi) \cdot \frac{1}{\pi + \pi} = -\frac{1}{2\pi}$$

$$\oint_{c_2} \frac{g(z)}{z - \pi} dz = \frac{2\pi i g(\pi)}{0!} = \frac{2\pi i}{-2\pi} = -i$$




Bild 18 c): Kurven $c_1 : |z + 2| = 2$ und $c_2 : |z - 1.5| = 2$

d) $c : |z - i| = 3$ umschließt zunächst beide Singularität $z_0 = -2$ und $z_1 = 1$

Partialbruchzerlegung:
$$\frac{z^2 + 3z - 1}{z^2 + z - 2} = 1 + \frac{1}{z - 1} + \frac{1}{z + 2},$$

$$\oint_c \frac{z^2 + 3z - 1}{z^2 + z - 2} dz = \oint_c dz + \oint_c \frac{1}{z - 1} dz + \oint_c \frac{1}{z + 2} dz = 0 + 2\pi i + 2\pi i = 4\pi i$$




Bild 18 d): Kurve $c : |z - i| = 3$

e) Isolierte Singularität bei $z_0 = 0$ liegt in $c : |z| = \pi$

$$\oint_{|z|=\pi} z^2 + \frac{e^z}{z^2} dz = \oint_{|z|=\pi} z^2 dz + \oint_{|z|=\pi} \frac{e^z}{z^2} dz = 0 + 2\pi i \frac{(e^z)'}{1!} \Big|_{z=0} = 2\pi i$$




Bild 18 e): Kurve $c : |z| = \pi$

f) Einzige Singularität bei $z_0 = 1 + i$,

$\ln z$ ist im von der Kurve $c : |z - 1 - 2i| = 2$ umschlossenen Gebiet holomorph.

$$\ln^{(iv)} z = -\frac{6}{z^4} \Rightarrow \ln^{(iv)}(1 + i) = -\frac{6}{(1 + i)^4} = -\frac{6}{(\sqrt{2}e^{i\pi/4})^4} = \frac{3}{2}$$

$$\oint_c \frac{\ln z}{(z - 1 - i)^5} dz = \frac{2\pi i \ln^{(iv)}(1 + i)}{4!} = \frac{\pi i}{8}$$




Bild 18 f): Kurve $c : |z - 1 - 2i| = 2$

Lösung 19:

- a) Der Integrand f wird unter Berücksichtigung des Entwicklungspunktes $z_0 = 1$ so umgeformt, dass die Summenformel für die geometrische Reihe angewendet werden kann.

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \frac{1}{5 - 3\xi} = \frac{1}{5 - 3(\xi - 1) - 3} = \frac{1}{2 - 3(\xi - 1)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{3(\xi - 1)}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3(\xi - 1)}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^{n+1}} (\xi - 1)^n \end{aligned}$$

Diese Reihe konvergiert für $|3(\xi - 1)/2| < 1$ gleichmäßig, darf also in der Kreisscheibe $|\xi - 1| < 2/3 =: R$ gliedweise integriert werden:

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_1^z \frac{d\xi}{5 - 3\xi} = \int_1^z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^{n+1}} (\xi - 1)^n d\xi \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^{n+1}} \int_1^z (\xi - 1)^n d\xi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(n + 1)2^{n+1}} (z - 1)^{n+1}. \end{aligned}$$

b) (i) $f(z) = \frac{5z}{z^2 - 2z + 2} = \frac{5z}{(z - (1 + i))(z - (1 - i))}$

Die Singularitäten liegen bei $z_1 = 1 + i$ und $z_2 = 1 - i$. Damit ergibt sich der Konvergenzradius der Taylorreihe zum Entwicklungspunkt z_0 durch

$$r = \min\{|z_1 - z_0|, |z_2 - z_0|\}.$$

Für $z_0 = -1$ bzw. $z_0 = -1 - i$ erhält man:

$$\begin{aligned} r_1 &= \min\{|1 + i - (-1)|, |1 - i - (-1)|\} \\ &= \min\{|2 + i|, |2 - i|\} = \sqrt{5}, \\ r_2 &= \min\{|1 + i - (-1 - i)|, |1 - i - (-1 - i)|\} \\ &= \min\{2|1 + i|, 2\} = 2. \end{aligned}$$

(ii) Die Singularitäten von $f(z) = \frac{1}{\cosh z}$ ergeben sich aus

$$0 = \cosh z = \cos y \cosh x + i \sin y \sinh x$$

$$\Rightarrow \cos y = 0 \Rightarrow y = \pi/2 + k\pi$$

$$\Rightarrow \sin(\pi/2 + k\pi) \sinh x = (-1)^k \sinh x = 0 \Rightarrow x = 0$$

Die Singularitäten liegen also bei $z_k = (\pi/2 + k\pi)i$, $k \in \mathbf{Z}$.

Der Konvergenzradius für $z_0 = \frac{7i}{2}$ ergibt sich durch:

$$\begin{aligned} r &= \min_k \{|z_k - z_0|\} = \min_k \{|(\pi/2 + k\pi)i - \frac{7i}{2}|\} \\ &= \min_k |\pi + 2k\pi - 7|/2 = |\pi + 2\pi - 7|/2 \approx 1.2124 \end{aligned}$$

(iii) Der Hauptwert des Logarithmus der Funktion $\ln(3z+5)$ ist nur in der geschlitzten Ebene definiert, d.h. reelle Wert x mit $3x + 5 \leq 0 \Rightarrow x \leq -5/3$ sind nicht zugelassen. Der Konvergenzradius ergibt sich daher als kleinster Abstand zu dieser nicht definierten Halbgeraden.

Für $z_0 = 0$ erhält man $r_1 = |0 - (-5/3)| = 5/3$

und für $z_0 = i$ erhält man $r_2 = |i - (-5/3)| = \sqrt{34}/3$.

Lösung 20:

Die Faktorisierung des Nenners $z^2 - 1 = (z+1)(z-1)$ ergibt die Singularitäten der Funktion bei $z_1 = -1$ und $z_2 = 1$. Eine Partialbruchzerlegung liefert:

$$f(z) = \frac{2z}{(z+1)(z-1)} = \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-1}.$$

a) Aufgrund der Lage des Entwicklungspunktes bei $z_0 = 2$ und der beiden Singularitäten $z_1 = -1$ und $z_2 = 1$ kann man ablesen, dass eine Taylor-Reihenentwicklung in der Kreisscheibe $|z - 2| < 1$ vorliegen wird, eine Laurent-Reihenentwicklung im Kreisring $1 < |z - 2| < 3$ und eine davon verschiedene Laurent-Reihenentwicklung im Außenraum $3 < |z - 2|$.




Bild 20 a): Konvergenzbereiche der Laurent-Reihenentwicklungen um $z_0 = 2$

Mit Hilfe der Summenformel der geometrischen Reihe im entsprechenden Konvergenzbereich können die Partialbrüche durch Reihenentwicklungen dargestellt werden:

$$|z - 2| < 1 \quad :$$

$$\frac{1}{z - 1} = \frac{1}{1 + (z - 2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z - 2)^n$$

$$|z - 2| > 1 \quad :$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z - 1} &= \frac{1}{z - 2} \cdot \frac{1}{1 + 1/(z - 2)} = \frac{1}{z - 2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{z - 2} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(z - 2)^{n+1}} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n (z - 2)^n \end{aligned}$$

$$|z - 2| < 3 \quad :$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z + 1} &= \frac{1}{3 + z - 2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + (z - 2)/3} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z - 2}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z - 2)^n \end{aligned}$$

$$|z - 2| > 3 \quad :$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z + 1} &= \frac{1}{z - 2} \cdot \frac{1}{1 + 3/(z - 2)} = \frac{1}{z - 2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{3}{z - 2} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n (-1)^n}{(z - 2)^{n+1}} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z - 2)^n . \end{aligned}$$

Taylor-Reihe mit Konvergenz in der Kreisscheibe $|z - 2| < 1$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-2)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{3^{n+1}} + 1 \right) (z-2)^n . \end{aligned}$$

Laurent-Reihe mit Konvergenz im Kreisring $1 < |z - 2| < 3$:

$$f(z) = \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-1} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-2)^n}_{\text{Nebenteil}} - \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n (z-2)^n}_{\text{Hauptteil}} .$$

Laurent-Reihe mit Konvergenz im Außenring $3 < |z - 2|$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-1} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-2)^n - \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n (z-2)^n \\ &= - \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n \left(\frac{1}{3^{n+1}} + 1 \right) (z-2)^n . \end{aligned}$$

- b) Da der Entwicklungspunkt $z_0 = -1$ mit der Singularität $z_1 = -1$ übereinstimmt, gibt es keine Taylor-Reihenentwicklung.




Bild 20 b): Konvergenzbereiche der Laurent-Reihenentwicklungen um $z_0 = -1$

Analog zu a) ergibt sich:

$$|z + 1| < 2 \quad :$$

$$\frac{1}{z - 1} = \frac{1}{-2 + z + 1} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - (z + 1)/2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (z + 1)^n$$

$$|z + 1| > 2 \quad :$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z - 1} &= \frac{1}{z + 1} \cdot \frac{1}{1 - 2/(z + 1)} = \frac{1}{z + 1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z + 1}\right)^n \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{2^{n+1}} (z + 1)^n . \end{aligned}$$

In der punktierten Kreisscheibe $0 < |z + 1| < 2$ konvergente Laurent-Reihe:

$$f(z) = \frac{1}{z + 1} + \frac{1}{z - 1} = \underbrace{\frac{1}{z + 1}}_{\text{Hauptteil}} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (z + 1)^n}_{\text{Nebenteil}} .$$

Im Außenring $|z + 1| > 2$ konvergente Laurent-Reihe:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z + 1} + \frac{1}{z - 1} = \frac{1}{z + 1} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{2^{n+1}} (z + 1)^n \\ &= \frac{2}{z + 1} + \sum_{n=-\infty}^{-2} \frac{1}{2^{n+1}} (z + 1)^n . \end{aligned}$$

Lösung 21:

a) Einzige Singularität von f ist der Entwicklungspunkt $z_0 = 0$. Für $|z| > 0$ gilt:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^z - 1 - z - z^2/2}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(\frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \right) \\ &= \frac{z}{3!} + \frac{z^2}{4!} + \frac{z^3}{5!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(n + 2)!} \quad \Rightarrow \quad a_{-1} = 0 \end{aligned}$$

b) Einzige Singularität von f ist der Entwicklungspunkt $z_0 = -\pi$. Für $|z + \pi| > 0$ gilt:

$$\begin{aligned}
 f(z) &= z \sin\left(\frac{1}{z + \pi}\right) \\
 &= (z + \pi - \pi) \left(\frac{1}{z + \pi} - \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{(z + \pi)^3} + \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{(z + \pi)^5} \mp \dots \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{(z + \pi)^2} + \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{(z + \pi)^4} \mp \dots \right) \\
 &\quad + \left(-\frac{\pi}{z + \pi} + \frac{\pi}{3!} \cdot \frac{1}{(z + \pi)^3} \mp \dots \right) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z + \pi} \right)^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z + \pi} \right)^{2n+1} \\
 &\Rightarrow a_{-1} = -\pi
 \end{aligned}$$

c) Einzige Singularität von f ist der Entwicklungspunkt $z_0 = 0$. Für $|z| > 0$ gilt:

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{\cos z}{z^5} = \frac{1}{z^5} \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} \pm \dots \right) \\
 &= \left(\frac{1}{z^5} - \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^3} + \frac{1}{4!} \cdot \frac{1}{z} - \frac{z}{6!} \pm \dots \right) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n-5} \quad \Rightarrow \quad a_{-1} = \frac{1}{4!}
 \end{aligned}$$

Lösung 22:

a) Die Singularitäten von

$$f(z) = \frac{1}{z^4 + z^2} = \frac{1}{z^2(z^2 + 1)} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^2 + 1}$$

sind gegeben durch die Nennernullstellen, die keine Zählernullstellen sind:

$z_1 = i$ und $z_2 = -i$ sind Pole 1. Ordnung und $z_3 = 0$ ist Pol 2. Ordnung.

$$\operatorname{Res}(f; z_1) = \frac{1}{(z^4 + z^2)' \Big|_{z=i}} = \frac{1}{4z^3 + 2z} \Big|_{z=i} = \frac{1}{4i^3 + 2i} = \frac{i}{2}$$

$$\operatorname{Res}(f; z_2) = (z + i) \cdot \frac{1}{z^4 + z^2} \Big|_{z=-i} = \frac{1}{z^2(z - i)} \Big|_{z=-i} = \frac{1}{(-i)^2(-2i)} = -\frac{i}{2}$$

$$\operatorname{Res}(f; z_3) = \frac{1}{1!} \left(z^2 \left(\frac{1}{z^4 + z^2} \right) \right)' \Big|_{z=0} = \left(\frac{1}{z^2 + 1} \right)' \Big|_{z=0} = -\frac{2z}{(z^2 + 1)^2} \Big|_{z=0} = 0$$

Die Laurent-Entwicklung im Außengebiet $|z| > 1$ ergibt sich durch:

$$f(z) = \frac{1}{z^4 + z^2} = \frac{1}{z^4} \cdot \frac{1}{1 + 1/z^2} = \frac{1}{z^4} \left(1 - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^4} \dots \right) = \frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^6} + \frac{1}{z^8} \dots$$

$$b) f(z) = \sin \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}}_{=: a_n} \frac{1}{z^{2n+1}} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} + \dots$$

Die einzige Singularität $z_0 = 0$ ist wesentlich mit
 $\text{Res}(f; z_0) = a_{-1} = 1.$

$$c) f(z) = \frac{z - \sin z}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(\frac{z^3}{3!} - \frac{z^5}{5!} + \frac{z^7}{7!} + \dots \right) = \frac{z}{3!} - \frac{z^3}{5!} + \frac{z^5}{7!} + \dots$$

Die einzige Singularität $z_0 = 0$ ist hebbar mit
 $\text{Res}(f; z_0) = a_{-1} = 0.$

d) Die Singularitäten von $f(z) = \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}$ ergeben sich aus:

$$\begin{aligned} 0 &= \sinh z = \frac{1}{2} (e^z - e^{-z}) = \frac{1}{2} (e^{x+iy} - e^{-x-iy}) \\ &= \frac{1}{2} (e^x (\cos y + i \sin y) - e^{-x} (\cos y - i \sin y)) \\ &= \cos y \sinh x + i \sin y \cosh x. \end{aligned}$$

Die Lösungen sind gegeben durch $y = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ und $x = 0$. Die Nennernullstellen $z_k = ik\pi$ sind einfach und auch keine Zählernullstellen, denn

$$(\sinh z)'|_{z=ik\pi} = \cosh ik\pi = \cos k\pi \neq 0.$$

Also sind z_k Pole 1. Ordnung und man erhält

$$\text{Res}(f; z_k) = \left(\frac{\cosh z}{(\sinh z)'} \right) \Big|_{z=z_k} = \left(\frac{\cosh z}{\cosh z} \right) \Big|_{z=z_k} = 1.$$

Es gibt kein Außengebiet ohne Singularitäten.

Lösung 23:

a) Aus der Faktorisierung

$$z^4 - z^2 - 2z + 2 = (z + 1 - i)(z + 1 + i)(z - 1)^2$$

ergeben sich die Nennernullstellen, die keine Zählernullstellen sind

$$z_0 = -1 + i, \quad z_1 = -1 - i, \quad z_2 = 1.$$

Damit sind z_0 und z_1 Pole 1. Ordnung und z_2 ist Pol 2. Ordnung.

Der Hauptteil der Laurententwicklung in $z_k, k = 0, 1$ besitzt damit die Form

$$h(z, z_k) = \frac{a_{-1,k}}{z - z_k}, \quad \text{wobei} \quad a_{-1,k} = \text{Res}(f(z); z_k)$$

gilt. Für $z_0 = -1 + i$ ergibt sich

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f(z); -1 + i) &= \frac{25}{(z + 1 + i)(z - 1)^2} \Big|_{z=-1+i} \\ &= \frac{25}{(-1 + i + 1 + i)(-1 + i - 1)^2} \\ &= \frac{25}{2i(3 - 4i)} = \frac{25(3 + 4i)}{2i \cdot 25} = \frac{4 - 3i}{2} \end{aligned}$$

Zum gleichen Ergebnis führt die Taylor-Reihenentwicklung des holomorphen Anteils von f um $z_0 = -1 + i$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z + 1 - i} \cdot \underbrace{\frac{25}{(z + 1 + i)(z - 1)^2}}_{= g_1(z), (\text{holom.})} \\ &= \frac{1}{z + 1 - i} (g_1(-1 + i) + g_1'(-1 + i)(z + 1 - i) + \dots) \end{aligned}$$

mit $g_1(-1 + i) = \operatorname{Res}(f(z); -1 + i) = \frac{4 - 3i}{2}$. Insgesamt erhält man also

$$\begin{aligned} f(z) &= \underbrace{\frac{4 - 3i}{2(z + 1 - i)}}_{= h(z, -1 + i)} + \underbrace{g_1'(-1 + i) + \dots}_{\text{Nebenteil}} \end{aligned}$$

Für $z_1 = -1 - i$ ergibt sich entsprechend

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z + 1 + i} \cdot \underbrace{\frac{25}{(z + 1 - i)(z - 1)^2}}_{= g_2(z), (\text{holom.})} \\ &= \frac{1}{z + 1 + i} (g_2(-1 - i) + g_2'(-1 - i)(z + 1 + i) + \dots) \end{aligned}$$

mit $g_2(-1 - i) = \operatorname{Res}(f(z); -1 - i) = \frac{4 + 3i}{2}$. Insgesamt erhält man also

$$\begin{aligned} f(z) &= \underbrace{\frac{4 + 3i}{2(z + 1 + i)}}_{= h(z, -1 - i)} + \underbrace{g_2'(-1 - i) + \dots}_{\text{Nebenteil}} \end{aligned}$$

Für den Pol 2. Ordnung $z_2 = 1$ erhält man den Hauptteil der Laurent-Reihe um z_2 über die Taylor-Reihenentwicklung des holomorphen Anteils g_3 von f :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z - 1)^2} \cdot \frac{25}{(z + 1 - i)(z + 1 + i)} = \frac{1}{(z - 1)^2} \cdot \underbrace{\frac{25}{z^2 + 2z + 2}}_{= g_3(z)} \\ &= \frac{1}{(z - 1)^2} \left(g_3(1) + g_3'(1)(z - 1) + \frac{1}{2} g_3''(1)(z - 1)^2 + \dots \right) \end{aligned}$$

Nach kurzer Rechnung erhält man

$$g_3(1) = 5, \quad g_3'(1) = -4 = \text{Res}(f(z); 1)$$

$$\Rightarrow f(z) = \underbrace{\frac{5}{(z-1)^2} - \frac{4}{z-1}}_{= h(z, 1)} + \underbrace{g_3''(1)/2 + \dots}_{\text{Nebenteil}}$$

Die komplexe Partialbruchzerlegung lautet deshalb:

$$f(z) = h(z, -1+i) + h(z, -1-i) + h(z, 1)$$

$$= \frac{4-3i}{2(z+1-i)} + \frac{4+3i}{2(z+1+i)} + \frac{5}{(z-1)^2} - \frac{4}{z-1}.$$

Als reelle Partialbruchzerlegung ergibt sich:

$$f(z) = \frac{4z+7}{z^2+2z+2} + \frac{5}{(z-1)^2} - \frac{4}{z-1}.$$

b) Von den Singularitäten von f

$$z_0 = -1+i, \quad z_1 = -1-i, \quad z_2 = 1.$$

liegen nur z_0 und z_1 innerhalb von c .




Bild 23: Kreis $c: |z+2| = 2$

Damit ergibt sich nach dem Residuensatz

$$\oint_c f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f; -1+i) + \text{Res}(f; -1-i))$$

$$= 2\pi i \left(\frac{4-3i}{2} + \frac{4+3i}{2} \right) = 8\pi i.$$

Lösung 24:

- a) Die Singularitäten der Funktion $f(z) = \frac{1}{z^2 - 4z + 6}$ liegen bei $z_1 = 2 + i\sqrt{2}$ und $z_2 = 2 - i\sqrt{2}$, sind Pole 1. Ordnung, und man erhält:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 6} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}(f; z_1) = 2\pi i \left. \frac{1}{z - 2 + i\sqrt{2}} \right|_{z=z_1} \\ &= 2\pi i \frac{1}{2i\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

- b) Beachtet man, dass $g(x) = \frac{\sin x}{x^4 + 324}$ eine ungerade Funktion ist, so ergibt sich

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^4 + 324} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^4 + 324} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4 + 324} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{e^{ix}}{x^4 + 324}}_{=f(x)} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}(f(z); z_k). \end{aligned}$$

Die Singularitäten der Funktion $f(z)$ ergeben sich aus $z^4 + 324 = 0$ und lauten daher

$$z_0 = 3 + 3i, \quad z_1 = -3 + 3i, \quad z_2 = -3 - 3i, \quad z_3 = 3 - 3i.$$

Es sind Pole 1. Ordnung, wovon nur $z_{0,1}$ in der oberen Halbebene liegen mit den Residuen

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f; z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = \frac{e^{iz_0}}{(z_0 - z_1)(z_0 - z_2)(z_0 - z_3)} \\ &= \frac{e^{i(3+3i)}}{6(6+6i)6i} = \frac{e^{-3+3i}}{216(1-i)} = \frac{e^{-3}}{432} \cdot e^{3i}(1+i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f; z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1)f(z) = \frac{e^{iz_1}}{(z_1 - z_0)(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)} \\ &= \frac{e^{i(-3+3i)}}{-6 \cdot 6i(-6+6i)} = \frac{e^{-3-3i}}{216(1+i)} = \frac{e^{-3}}{432} \cdot e^{-3i}(1-i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^4 + 324} dx &= 2\pi i (\operatorname{Res}(f; z_0) + \operatorname{Res}(f; z_1)) \\ &= 2\pi i \left(-\frac{e^{-3}}{432} \cdot e^{3i}(1+i) + \frac{e^{-3}}{432} \cdot e^{-3i}(1-i) \right) \\ &= \frac{e^{-3}\pi i}{216} (-e^{3i} + e^{-3i} - i(e^{3i} + e^{-3i})) \\ &= \frac{e^{-3}\pi i}{216} (-2i(\sin 3 + \cos 3)) = \frac{e^{-3}\pi}{108} (\sin 3 + \cos 3). \end{aligned}$$

- c) Die hebbare Singularität bei $x = 1$ wird gekürzt und dann wird durch $y = x + 2$ substituiert:

$$\int_{-2}^{\infty} \frac{x-1}{(x^2+3x-4)\sqrt{x+2}} dx = \int_{-2}^{\infty} \frac{1}{(x+4)\sqrt{x+2}} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{(y+2)\sqrt{y}} dy.$$

Nun besitzt der Integrand die Standardform $\frac{r(y)}{y^\alpha} = \frac{1}{(y+2)\sqrt{y}}$ mit $r(y) = \frac{1}{y+2}$ und $\alpha = 1/2$. $r(z)$ besitzt nur die Singularität $z_1 = -2$ und man erhält:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(y+2)\sqrt{y}} dy = \frac{2\pi i}{1-e^{-\pi i}} \operatorname{Res} \left(\frac{1}{(z+2)\sqrt{z}}; z_1 \right) = \frac{2\pi i}{1-e^{-\pi i}} \cdot \frac{1}{\sqrt{-2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

- d) Mit $z = e^{i\varphi}$ substituiere man

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \quad \text{bzw.} \quad \sin \varphi = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right).$$

Die Substitution erfordert noch die Berechnung von:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{d\varphi} &= ie^{i\varphi} = iz \Rightarrow d\varphi = \frac{dz}{iz} \\ \int_0^{2\pi} \frac{\sin \varphi}{4 + \cos \varphi} d\varphi &= \int_{|z|=1} \frac{\frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right)}{4 + \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)} \cdot \frac{dz}{iz} = - \int_{|z|=1} \underbrace{\frac{z^2 - 1}{z(z^2 + 8z + 1)}}_{=f(z)} dz \end{aligned}$$

Die Singularitäten von f ergeben sich aus $0 = z(z^2 + 8z + 1)$. Man erhält

$$z_0 = 0, \quad z_1 = -4 + \sqrt{15}, \quad z_2 = -4 - \sqrt{15}.$$

Nur von den im Einheitskreis liegenden $z_{0,1}$ werden die Residuen benötigt.

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f; z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = \frac{z_0^2 - 1}{z_0^2 + 8z_0 + 1} = -1 \\ \operatorname{Res}(f; z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1)f(z) = \frac{z_1^2 - 1}{(z_1 - z_0)(z_1 - z_2)} \\ &= \frac{16 - 8\sqrt{15} + 15 - 1}{(-4 + \sqrt{15})2\sqrt{15}} = \frac{15 - 4\sqrt{15}}{\sqrt{15}(-4 + \sqrt{15})} = 1 \end{aligned}$$

Aus dem Residuensatz erhält man damit

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{\sin \varphi}{4 + \cos \varphi} d\varphi &= -2\pi i (\operatorname{Res}(f; z_0) + \operatorname{Res}(f; z_1)) \\ &= -2\pi i (-1 + 1) = 0. \end{aligned}$$

Das Ergebnis überrascht nicht, da $\frac{\sin \varphi}{4 + \cos \varphi}$ eine 2π -periodische ungerade Funktion ist.