

Erinnerung.

9. Vorlesung.

1

Satz (Mantel) $T(n) = \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$

maximale Anzahl von Kanten in einem Graphen mit n Ecken, der kein Dreieck enthält.

• • • • •

Dfn. Es seien F ein Graph und $n \in \mathbb{N}$. Setze dann

$$ex(n, F) = \max \{ |E| : G = (V, E) \text{ ist Graph mit } |V| = n \text{ und } F \not\subseteq G. \}$$

Mir betrachten den Fall $F = K_r$.

Dfn. Für ganze Zahlen $n \geq 0$ und $r \geq 1$



Sei $T_r(n)$ der vollständig r -partiten Graphen auf n Ecken, bei dem sich die Größen der Seitenblöcke von höchstens 1 unterscheiden.

Es gibt also eine Partition

$$V(T_r(n)) = V_1 \cup \dots \cup V_r$$

mit


$$|V_1| \leq |V_2| \leq \dots \leq |V_r| \leq |V_{r-1}| + 1$$

und

$$E(T_r(n)) = \{ \{x, y\} \in V(T_r(n))^{\{2\}} : \text{Es gibt } i, j \in [r] \text{ mit } x \in V_i, y \in V_j, i \neq j \}$$

Beispiel. Wie sieht $T_3(7)$ aus?

$$\text{Hier } |V_1| = 2, |V_2| = 2, |V_3| = 3$$



Satz (Turán). Für $r \geq 2$ und $n \geq 0$ gibt's genau einen K_r -freien 3

Graphen auf n Ecken mit $ex(n, K_r)$ Kanten, nämlich $T_{r-1}(n)$

Beweis: Der Turán-Graph $T_{r-1}(n)$ ist K_r -frei (nach Selbstähnlichkeitsprinzip).
Somit $ex(n, K_r) \geq |E(T_{r-1}(n))|$. Argumentiere bei festem r
mit Induktion nach n .

MS r-1 | Wg. $T_{r-1}(n) = K_n$ klar.

n-(r-1) -> n | Sei $G = (V, E)$ ein K_r -freier Graph mit
 n Ecken und $ex(n, K_r)$ Kanten.

z.z. $G \cong T_{r-1}(n)$,

G enthält K_{r-1} , denn: Wg. $n \geq r$ ist $G \neq K_n$. Also

gibt's $e = \{x, y\} \in V^{(2)} \setminus E$. Da $G + e$ mehr als


ex (n, K_r) Konkrete hat, enthält G + e einem K_r .



Isolierte $K_{r-1} \subseteq G$.

$r=4$

Wähle $X \in V^{(r-1)}$ mit $G[X] \cong K_{r-1}$



Für $u \in V \setminus X$ ist $G[X \cup \{u\}] \not\cong K_r$, d.h. u

hat höchstens $r-2$ Nachbarn in X .


Somit

$$|E| \leq |E(K_{r-1})| + (r-2)|V \setminus X| + |E(T_{r-1}(n-(r-1)))|$$

$$\stackrel{(*)}{=} |E(T_{r-1}(n))|$$

$T_{r-1}(u)$

Wenn (*) ein Muster, betrachtet man $T_{r-1}(u)$:



K^{r-1} $T_{r-1}(u - (r-1))$

Damit ist

$$|E| = |E(T_{r-1}(u))|$$

griest. Außerdem hat jede Ecke $v \in V \setminus X$ genau $r-2$


Nachbarn in X . Schreibt man also

$$X = \{x_1, \dots, x_{r-1}\}$$

$$A_i = \{n \in V \setminus X : N(n) \cap X = X \setminus \{x_i\}\}$$

Für alle $i \in [r-1]$, so ist

$$V \setminus X = A_1 \cup \dots \cup A_{r-1}$$



Die Mengen A_1, \dots, A_{r-1} sind unabhängig, denn:

Gäbe es eine Kante $\{u, v\} \in E$ mit $u, v \in A_i$


für ein $i \in [r-1]$, dann wäre $(X \setminus \{x_i\}) \cup \{u, v\}$

ein K_r in G , Wid.

Also ist

$$V = (A_1 \cup \{x_1\}) \cup \dots \cup (A_{r-1} \cup \{x_{r-1}\})$$


eine Partition von V in nicht. Mengen.



Da G kernmaximal ohne K_G enthält G alle Kernen zwischen verschiedenen Ebenen.

Sehe $B_i = A_i \cup \{x_i\}$ für alle $i \in [r-1]$.

Anm! Es gibt $i, j \in [r-1]$ mit $|B_i| \geq |B_j| + 2$.



Es sei G' der Graph, den man aus G erhält, indem man eine Ecke aus B_i nach B_j schiebt.

Dann

$$|E(G')| - |E| = (|B_j| - 1)(|B_j| + 1) - |B_j| |B_j|$$

$$= |B_j| - |B_j| - 1 \geq -1.$$

□

Wid. zu $|E| = ex(n, K_r)$, da $K_r \notin G'$.

□

Bemerkung. Man kann $ex(n, K_r)$ so ausdrücken:

Division mit Rest liefert

$$n = q(r-1) + s \quad \text{mit} \quad 0 \leq s \leq r-2.$$

Die Eckzahlen von $T_{r-1}(n)$ haben die Größen

$$\underbrace{q, \dots, q}_{(r-1)-s}, \quad \underbrace{q+1, \dots, q+1}_s.$$

Also

$$\begin{aligned} \text{ex}(n, K_r) &= \binom{r-1-s}{2} q^2 + ((r-1)-s) s q(q+1) + \binom{s}{2} (q+1)^2 \\ &= \frac{r-2}{2(r-1)} \cdot n^2 - \frac{s(r-s-1)}{2(r-1)} \end{aligned}$$

Es folgt

$$\frac{r-2}{2(r-1)} n^2 - \frac{r-1}{8} \leq \text{ex}(n, K_r) \leq \frac{r-2}{2(r-1)} \cdot n^2$$

(\rightarrow Übung).

Insbesondere

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{ex}(n, K_r)}{\binom{n}{2}} = \frac{r-2}{r-1}$$

Allgemein nennt man

$$\pi(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\chi(n, F)}{\binom{n}{2}}$$

die Türan-Dichte von F . (Der Limes existiert!).



Mit Wissen $\pi(K_r) = \frac{r-2}{r-1}$.


Man kann $\pi(\text{Tur}(n)) = \frac{r-2}{r-1}$ (für $n \geq r$)
fragen (Erdős, Stone),

Sei $\chi(F)$ die kleinste Zahl von Farben, mit der
man $\text{Tur}(F)$ so färben kann, dass je zwei
benachbarte Ecken von F verschiedenfarbig sind.

(Chromatische Zahl von F).

$$\chi(\mathbb{R}P^3) = 4$$

$$\chi(\text{pentagon}) = 3$$






Satz (Erdős, Stone, Simonovits)

$$\pi(F) = \frac{\chi(F) - 2}{\chi(F) - 1}$$

HYPERGRAPHEN.

Dfn. Ein 3-uniformer Hypergraph ist ein Paar (V, E) ,
 das aus einer Menge V von Ecken und einer Menge $E \subseteq V^{(3)}$
 von Kanten besteht.




$K_4^{(3)}$ Tetraeder

Frage (Turán) Bestimme $ex(n, K_4^{(3)})$. Oder zumindest

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ex(n, K_4^{(3)})}{\binom{n}{3}} = \pi(K_4^{(3)})$$

Man vermutet

$$\pi(K_4^{(3)}) = \frac{5}{9}.$$



$n/3$

$n/3$

$n/3$

Skizze eines weiteren Beweises des Satzes von Menger.


Zykov: Für einen Graphen G und

$u, v \in V(G)$ sei $G' = \text{Sym}(G, u, v)$



der Graph mit

$$V(G') = V(G)$$

$$E(G') = (E(G) \setminus \{e : v \in e\}) \cup \{u, x\} \cup \{v, x\} \cup E(G)$$



G $\text{Sym}(G, u, v)$



Wenn $K_3 \not\subseteq G$ und $\{u, v\} \in E(G)$ dann $K_3 \not\subseteq \text{Sym}(G, u, v)$

dann $K_3 \not\subseteq \text{Sym}(G, u, v)$

Betrachte Graphen $G = (V, E)$ mit n Ecken und $\text{ex}(n, K_3)$ Kanten. 14

Schritt 1. Wenn $\{u, v\} \in V^{(2)} \setminus E$, dann $d(u) = d(v)$.

Denn: Sonst O.B.D.A. $d(u) > d(v)$.

Dann widerspricht $\text{Sym}(G, u, v)$ der Definition $\text{ex}(n, K_3)$.

Schritt 2. Wenn $\{u, v\} \in V^{(2)} \setminus E$ und $\{v, w\} \in V^{(2)} \setminus E$,

dann $v = w$ oder $\{v, w\} \in V^{(2)} \setminus E$.

Denn: Angenommen $\{v, w\} \in E$.

Nach Schritt 1 ist $d(u) = d(v) = d(w)$.

Betrachte $G' = \text{Sym}(G, u, v)$.

Dann $\{u, w\} \notin E(G')$ und $d_{G'}(w) < d_{G'}(u)$.

Wid. zu Schritt 1 ($\text{Für } G'$).