

Tragen Sie bitte zunächst Ihren Namen, Ihren Vornamen und Ihre Matrikelnummer in **DRUCKSCHRIFT** in die folgenden jeweils dafür vorgesehenen Felder ein.

Diese Eintragungen werden auf Datenträger gespeichert.

Name:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vorname:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matr.-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Studiengang:

AI	BU	BVT	ET	EUT	IN	LUM	MB	MTB	SB	VT	
----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	--

Aufg.	a) i)	a) ii)	b)	c) i)	c) ii)	d) i)	d) ii)	e)	f)	Σ =
Punkte	1	1	2	1	1	1	1	2	2	12
erreicht										

BONUS =

Bitte lösen Sie die angegebenen Aufgaben, und tragen Sie Ihre Antworten in die dafür vorgegebenen Kästchen ein. Sie erhalten jeweils 1 bzw. 2 Punkte pro richtige Antwort und null Punkte, wenn Sie eine falsche oder keine Lösung angegeben haben. Der Lösungsweg wird nicht bewertet.

a) Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-1)^k}{3^k}$ mit dem Entwicklungspunkt $x_0 = 1$

hat den Konvergenzradius

$r = 3$

und das Konvergenzintervall

$I =] - 2, 4[$

Hinweis: Klären Sie auch, ob die Reihe in den Randpunkten von I konvergiert!

- b) Es sei $p_2(x) = a_0 + a_1(x-2) + a_2(x-2)(x-4)$ das Interpolationspolynom zweiten Grades zu den Daten:

x_k	2	4	6
y_k	8	-8	16

Dann ist

$$a_2 = 5$$

- c) Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ die Potenzreihe der Funktion $f(x) = \frac{1}{5-25x}$ mit dem Entwicklungspunkt $x_0 = 0$. Dann ist

$$a_2 = 5$$

und die Potenzreihe hat den Konvergenzradius

$$r = \frac{1}{5}$$

- d) Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ die Potenzreihe der Funktion $f(x) = \sin(x) + xe^x$ mit dem Entwicklungspunkt $x_0 = 0$. Dann ist

$$a_4 = \frac{1}{6}$$

und die Potenzreihe hat den Konvergenzradius

$$r = \infty$$

e)

$$\int_0^{\pi/4} 4(2x+1)\cos(4x) dx = -1$$

f)

$$\int_0^{\sqrt{\ln(3)}} 2x e^{x^2} dx = 2$$