

Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften Blatt 6, Präsenzaufgaben

Aufgabe 1:

Berechnen Sie das Integral $\int_D (x^3 + xy^2 + y) d(x, y)$
über den Viertelkreisring

$$D := \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0\}.$$

Lösung zur Aufgabe 1:

Übergang zu Polarkoordinaten liefert


$$D := \left\{ (x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi), 2 \leq r \leq 3, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

und

$$\begin{aligned} \int_D (x^3 + xy^2 + y) d(x, y) &= \int_2^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (r^3(\cos^3(\varphi) + \sin^2(\varphi) \cos(\varphi)) + r \sin(\varphi)) r d\varphi dr \\ &= \int_2^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^4 \cos(\varphi)(\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)) + r^2 \sin(\varphi) d\varphi dr = \int_2^3 r^4 [\sin(\varphi)]_0^{\frac{\pi}{2}} + r^2 [-\cos(\varphi)]_0^{\frac{\pi}{2}} dr \\ &= \int_2^3 r^4 + r^2 dr = \left[\frac{r^5}{5} + \frac{r^3}{3} \right]_2^3 = \frac{243 - 32}{5} + \frac{27 - 8}{3} = \frac{211}{5} + \frac{19}{3} = 48,5\bar{3}. \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Gegeben ist die mit einer Flüssigkeit gefüllte Kugelschale

$$D := \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3; 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \leq 0\}.$$



In der Flüssigkeit befinden sich schwebende Teilchen eines Stoffes S . Die Dichte des Stoffes S beträgt

$$\rho(x, y, z) = -z.$$

Berechnen Sie die Masse des Stoffes S in D .

Hinweis: $2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \sin(2\theta)$.

Lösungsskizze zur Aufgabe 2:

$$\text{Kugelkoordinaten: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \Phi(\mathbf{u}) = \Phi \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ r \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ r \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

$$1 \leq r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \implies r \in [1, 2]$$

$$z = r \sin \theta \leq 0 \implies \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$$

Keine weitere Einschränkung: $\varphi \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} \int_D -z \, d(x, y, z) &= \int_1^2 \int_0^{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -r \sin(\theta) (r^2 \cos(\theta)) \, d\theta \, d\varphi \, dr \\ &= - \int_1^2 \int_0^{2\pi} r^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin(2\theta)}{2} \, d\theta \, d\varphi \, dr = - \int_1^2 \int_0^{2\pi} r^3 \left[-\frac{\cos(2\theta)}{4} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 \, d\varphi \, dr \\ &= - \int_1^2 r^3 \int_0^{2\pi} \left[\frac{-1}{4} - \frac{1}{4} \right] \, d\varphi \, dr \\ &= \pi \int_1^2 r^3 \, dr = \pi \left[\frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} \right] = \pi \frac{15}{4}. \end{aligned}$$

Bearbeitungstermine: 12.01.-16.01.2015