Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften Blatt 3, Präsenzaufgaben

Aufgabe 1:

Gegeben ist die Funktion

$$f : D := \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right] \times \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = 8 \cos(x + y) + \sin(x - y) + 12xy + 11x^2 + 8y^2.$$

- a) Besitzt f auf D ein Minimum und ein Maximum?
- b) Bestimmen Sie eine Näherung für ein lokales Minimum der Funktion f auf D indem Sie das Minimum des Taylorpolynoms zweiten Grades T_2 von f mit dem Entwicklungspunkt $(x_0, y_0)^T = (0, 0)^T$ berechnen.
Hinweis: Sie brauchen für diese Aufgabe keine einzige Ableitung von f zu berechnen. Benutzen Sie die Taylor-Reihen von Cosinus und Sinus.
- c) Zeigen Sie mit Hilfe von Teil b), dass der minimale Wert von f auf dem dort angegebenen Definitionsbereich nicht kleiner als 7.5 sein kann.
- d) T_2 ist stetig auf D . Müsste man nicht auch ein Maximum von T_2 finden?

Lösungshinweise zu 1:

- a) Da D abgeschlossen und beschränkt ist, und f stetig ist, besitzt f auf D ein globales Minimum und ein globales Maximum.
- b) Die polynomialen Anteile von f werden exakt wieder gegeben. Wegen $\cos(z) = 1 - \frac{z^2}{2} + O(z^4)$, $\sin(z) = z + O(z^3)$, erhält man ohne lange Rechnung der Ableitungen:

$$\begin{aligned} T_2(x, y) &= 8 - 4(x + y)^2 + (x - y) + 12xy + 11x^2 + 8y^2 \\ &= 8 + x - y + 7x^2 + 4xy + 4y^2, \end{aligned}$$

$$\text{grad } T_2(x, y) = (14x + 4y + 1, 8y + 4x - 1)^T = 0 \implies x = -\frac{1}{8}, y = \frac{3}{16},$$

$$H T_2(x, y) = \begin{pmatrix} 14 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \quad 14 > 0 \wedge 14 \cdot 8 - 4 \cdot 4 > 0 \implies \lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0.$$

Im Punkt $P_0 = \left(-\frac{1}{8}, \frac{3}{16}\right)^T$ liegt ein Minimum des Taylorpolynoms vor.

- c) Die dritten Ableitungen haben alle die Form $8 \sin(x + y) \pm \cos(x - y)$. Alle dritten Ableitungen sind also vom Betrag kleiner oder gleich 9. Es gilt daher

$$|R_2(x, y)| \leq \frac{(2^3) \cdot 9}{3!} \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{3}{16}.$$

Somit gilt

$$f(x, y) \geq T_2(x_{min}, y_{min}) - \frac{3}{16} \geq T_2\left(-\frac{1}{8}, \frac{3}{16}\right) - \frac{3}{16} = 8 - \frac{5}{32} - \frac{3}{16} = 8 - \frac{11}{32}$$

- d) Da T_2 stetig auf dem Kompaktum D ist, und es im Inneren von D kein Maximum gibt, muss das Maximum auf dem Rand liegen. Dieses könnte man durch die Lösung von vier Aufgaben (jeweils auf einer Kante) im $\mathbb{R}^1$ bestimmen.

Aufgabe 2) (Klausur 2009)

Zeigen Sie, dass durch

$$g(x, y) = y^2 \cdot x - y \cdot \exp(x + y) + 2 = 0$$

in der Umgebung von $P_0 = (-1, 1)$ implizit eine Funktion $y(x)$ definiert ist. Es gilt also lokal

$$g(x, y) = 0 \implies y = f(x), \quad f(-1) = 1.$$

Bestimmen Sie das Taylorpolynom ersten Grades der Funktion $f(x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = -1$.

Zusatz zur Klausuraufgabe: Berechnen Sie $f'(-1)$ mittels impliziter Differentiation.

Lösung zu Aufgabe 2) $g(x, y) = y^2 \cdot x - y \cdot \exp(x + y) + 2 = 0$

Für $g_y(x, y) = 2yx - \exp(x + y) - y \cdot \exp(x + y)$

gilt $g_y(-1, 1) = -2 - 1 - 1 = -4 \neq 0$.

Nach dem Satz über implizite Funktionen gibt es daher lokal eine Funktion f mit

$$g(x, y) = 0 \implies y = f(x), \quad f(-1) = 1.$$

Es gilt

$$f'(x) = -g_x/g_y = -\frac{y^2 - y \exp(x + y)}{2xy - \exp(x + y) - y \exp(x + y)} \implies$$

$$f'(-1) = \frac{1 - 1 \exp(0)}{-4} = 0$$

und damit

$$T_1(x; -1) = f(-1) + f'(-1)(x + 1) = 1.$$

Implizites Differenzieren: Auf der Lösungskurve gilt

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}g(x, y(x)) &= \frac{d}{dx} (y(x)^2 \cdot x - y(x) \cdot \exp(x + y(x)) + 2) \\ &= 2y(x)y'(x) \cdot x + y(x)^2 - y(x)' \cdot \exp(x + y(x)) - y(x) \cdot \exp(x + y(x)) \cdot (1 + y'(x)) = 0.\end{aligned}$$

Einsetzen von $x = -1$ und $y(-1) = 1$ ergibt:

$$-2y'(-1) + 1 - y'(-1) \cdot \exp(0) - \exp(0) \cdot (1 + y'(-1)) = -4y'(-1) = 0.$$

Also $f'(-1) = y'(-1) = 0$.

Bearbeitungstermine: 14.12.–18.12.20