

Differentialgleichungen II für Studierende der Ingenieurwissenschaften

Blatt 2, Hausaufgaben

Aufgabe 1:

Bestimmen Sie die Lösungen der folgenden Anfangswertaufgaben für $t \in \mathbb{R}^+$, $x \in \mathbb{R}$.

a) $u_t + 3u_x = 0$ mit $u(x, 0) = u_0(x) = xe^{-x}$.

b) $2u_t + x^2u_x = \frac{1}{u}$ mit $u(x, 0) = 2\sqrt{e^{-4x^2}}$.

Existiert die Lösung für alle $t \in \mathbb{R}^+$, $x \in \mathbb{R}$?

Wenn nicht, kann die Lösung in den Definitionslücken stetig ergänzt werden?

Aufgabe 2:

Ein einfaches Verkehrsflussmodell:

Wir betrachten einen eindimensionalen Fluss von Fahrzeugen entlang einer unendlich langen, einspurigen Fahrbahn. In einem sogenannten makroskopischen Modell betrachtet man nicht einzelne Fahrzeuge, sondern den Gesamtfluss der Fahrzeuge. Dazu führen wir folgende Größen ein :

$$\begin{aligned} u(x, t) &= (\text{Längen-})\text{Dichte der Fahrzeuge im Punkt } x \text{ zum Zeitpunkt } t \\ &= \text{Fahrzeuge/Längeneinheit im Punkt } x \text{ zum Zeitpunkt } t \end{aligned}$$

$$v(x, t) = \text{Geschwindigkeit im Punkt } x \text{ zum Zeitpunkt } t,$$

$$\begin{aligned} q(x, t) &= u(x, t) \cdot v(x, t) = \text{Fluss} \\ &= \text{Anzahl Fahrzeuge, die } x \text{ zum Zeitpunkt } t \text{ pro Zeiteinheit passieren.} \end{aligned}$$

- a) Nehmen Sie an, dass es keine Ein- bzw. Ausfahrten gibt, dass keine Fahrzeuge verschwinden, und dass keine neuen Fahrzeuge hinzukommen. Sei $N(t, a, \Delta a) :=$ Anzahl Fahrzeuge auf einem Ortsintervall $[a, a + \Delta a]$ zum Zeitpunkt t . Machen Sie sich klar, dass dann einerseits

$$N(t, a, \Delta a) = \int_a^{a+\Delta a} u(x, t) dx$$

gilt und andererseits

$$N(t, a, \Delta a) - N(t_0, a, \Delta a) = \int_{t_0}^t q(a, \tau) - q(a + \Delta a, \tau) d\tau.$$

Leiten Sie hieraus die sogenannte Erhaltungsgleichung für die Masse (Anzahl Fahrzeuge)

$$u_t + q_x = 0$$

her.

Tipps zum Vorgehen:

- Leiten Sie beide Formeln für N nach t ab. Beachten Sie dabei, dass für die Ableitung Parameterabhängiger Integrale bei hinreichender Glattheit von f die folgende **Leibniz-Regel** gilt:

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{d}{dx} f(x, t) dt + b'(x) f(x, b(x)) - a'(x) f(x, a(x))$$

- Teilen Sie durch Δa .
 - Betrachten Sie den Grenzfall $\Delta a \rightarrow 0$.
- b) Nehmen Sie zusätzlich an, dass die Geschwindigkeit nur von der Dichte abhängt: $v = v(u)$. Zeigen Sie, dass in diesem Fall die Gleichung

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{dq}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

die Erhaltung der Masse beschreibt.

- c) Wir nehmen nun in einem ersten einfachen Modell an, dass die Geschwindigkeit umgekehrt proportional zur Dichte wächst und die Dichte positiv ist.

$$v(x, t) = c + \frac{k}{u(x, t)}$$

Wie lautet die Kontinuitätsgleichung (=Erhaltungsgleichung für die Masse)?

Bemerkung : Dies ist ein sehr einfaches, linearisiertes Modell. Es lässt z.B. beliebig hohe Dichte und beliebig hohe Geschwindigkeit zu. Bei einem etwas realistischerem Problem würden sich hier schon Stoßwellen und Verdünnungswellen ergeben (siehe spätere Übungen).

Abgabe bis: 28.04.23