Differentialgleichungen II für Studierende der Ingenieurwissenschaften

Blatt 6, Hausaufgaben

Aufgabe 1:

a) Lösen Sie die Anfangswertaufgabe

$$\begin{aligned}u_{tt} &= u_{xx}, & \text{auf } \mathbb{R}^2, \\u(x, 0) &= 2 \sin(4\pi x) & x \in \mathbb{R}, \\u_t(x, 0) &= \cos(\pi x) & x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

b) Gegeben sei die Aufgabe

$$\begin{aligned}u_{tt} &= 9u_{xx}, & \text{für } x \in \mathbb{R}, t > 0, \\u(x, 0) &= u_0(x) = \begin{cases} 2 & -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases} \\u_t(x, 0) &= 0.\end{aligned}$$

Skizzieren Sie die Lösung, die man mit der Formel von d'Alembert erhält für $t = 0, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$.

Lösung:

a) Lösung nach d'Alembert

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \sin(4\pi(x+t)) + \sin(4\pi(x-t)) + \frac{1}{2c} \int_{x-t}^{x+t} \cos(\pi\eta) d\eta \\&= 2 \sin(4\pi x) \cos(4\pi t) + \frac{\sin(\pi\eta)}{2\pi} \Big|_{x-t}^{x+t} \\&= 2 \sin(4\pi x) \cos(4\pi t) + \frac{1}{2\pi} (\sin(\pi(x+t)) - \sin(\pi(x-t))) \\&= 2 \sin(4\pi x) \cos(4\pi t) + \frac{1}{\pi} (\cos(\pi x) \cdot \sin(\pi t)).\end{aligned}$$

b) Nach d'Alembert gilt $u(x, t) = \frac{1}{2}(u_0(x + 3t) + u_0(x - 3t))$, wobei

$$u_0(x + 3t) = \begin{cases} 2 & -1 - 3t \leq x \leq 1 - 3t, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{und}$$

$$u_0(x - 3t) = \begin{cases} 2 & -1 + 3t \leq x \leq 1 + 3t, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Also erhalten wir für $-1 + 3t \leq 1 - 3t \iff t \leq \frac{1}{3}$

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x < -1 - 3t, \\ 1 & -1 - 3t \leq x < -1 + 3t, \\ 2 & -1 + 3t \leq x \leq 1 - 3t, \\ 1 & 1 - 3t < x \leq 1 + 3t, \\ 0 & 1 + 3t < x. \end{cases}$$

Zum Beispiel erhält man für $t = 1/6$:

$$x - 3t = x - 0.5 \in [-1, 1] \iff x \in [-0.5, 1.5] \quad \text{und}$$

$$x + 3t = x + 0.5 \in [-1, 1] \iff x \in [-1.5, 0.5]$$

$$u(x, \frac{1}{6}) = \begin{cases} 0 & x < -1.5, \\ 1 & -1.5 \leq x < -0.5, \\ 2 & -0.5 \leq x \leq 0.5, \\ 1 & 0.5 < x \leq 1.5, \\ 0 & 1.5 < x. \end{cases}$$

Analog berechnet man die Lösung für $t = \frac{1}{3}$

$$u(x, \frac{1}{3}) = \begin{cases} 0 & x < -2, \\ 1 & -2 \leq x < 0, \\ 2 & 0 \leq x \leq 0, \\ 1 & 0 < x \leq 2, \\ 0 & 2 < x. \end{cases}$$

Für $t > \frac{1}{3}$ gilt $1 - 3t < -1 + 3t$

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x < -1 - 3t, \\ 1 & -1 - 3t \leq x < 1 - 3t, \\ 0 & 1 - 3t \leq x \leq -1 + 3t, \\ 1 & -1 + 3t < x \leq 1 + 3t, \\ 0 & 1 + 3t < x. \end{cases}$$

und damit

$$u(x, \frac{2}{3}) = \begin{cases} 0 & x < -3, \\ 1 & -3 \leq x < -1, \\ 0 & -1 \leq x \leq 1, \\ 1 & 1 < x \leq 3, \\ 0 & 3 < x. \end{cases}$$

sowie

$$u(x, 1) = \begin{cases} 0 & x < -4, \\ 1 & -4 \leq x < -2, \\ 0 & -2 \leq x \leq 2, \\ 1 & 2 < x \leq 4, \\ 0 & 4 < x. \end{cases}$$

Anschaulich zerfällt die ursprüngliche (eckige) Welle in zwei Wellen, die in entgegengesetzte Richtungen laufen.

Aufgabe 2:

Gesucht ist eine Näherung für die Lösung des folgenden Problems

$$\begin{aligned}
 u_{tt} &= u_{xx} & x \in (0, 2\pi), t > 0, \\
 u(x, 0) &= \begin{cases} x & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \pi - x & \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \\ x - 2\pi & \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \end{cases} \\
 u_t(x, 0) &= 0 & x \in (0, 2\pi) \\
 u(0, t) &= u(2\pi, t) = 0 & t > 0
 \end{aligned}$$

Skizzieren Sie die 2π periodische Fortsetzung der Anfangsdaten für $x \in [-2\pi, 4\pi]$.

Bestimmen Sie eine Näherung $\tilde{u}$ für die Lösung u der Aufgabe indem Sie die auftretenden Fourier-Reihen nach dem dritten Term abbrechen. Prüfen Sie nach, welche Rand- bzw. Anfangsbedingungen bereits durch diese Näherungslösung erfüllt wird.

Lösung:

Allgemeine Lösung:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos(ck\omega t) + B_k \sin(ck\omega t)) \cdot \sin(k\omega x)$$

Mit $\omega = \frac{\pi}{L} = \frac{\pi}{2\pi}$ und $c = 1$. Also

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos\left(\frac{k}{2} t\right) + B_k \sin\left(\frac{k}{2} t\right) \right) \cdot \sin\left(\frac{k}{2} x\right)$$

$$u_t(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2} (-A_k \sin(0) + B_k \cos(0)) \cdot \sin\left(\frac{k}{2} x\right) \stackrel{!}{=} 0 \implies B_k = 0, \forall k$$

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos\left(\frac{k}{2} t\right) \sin\left(\frac{k}{2} x\right)$$

$$\text{mit } u(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin\left(\frac{k}{2} x\right) \stackrel{!}{=} \begin{cases} x & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \pi - x & \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \\ x - 2\pi & \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \end{cases}$$

Also:

$$\begin{aligned}
 A_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_0(x) \sin\left(\frac{k}{2}x\right) dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi/2} x \sin\left(\frac{k}{2}x\right) dx + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (\pi - x) \sin\left(\frac{k}{2}x\right) dx + \int_{3\pi/2}^{2\pi} (x - 2\pi) \sin\left(\frac{k}{2}x\right) dx \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(\left[-x \frac{\cos\left(\frac{k}{2}x\right)}{\frac{k}{2}} \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \frac{2}{k} \cos\left(\frac{k}{2}x\right) dx \right. \\
 &\quad + \left[-(\pi - x) \frac{2}{k} \cos\left(\frac{k}{2}x\right) \right]_{\pi/2}^{\frac{3\pi}{2}} - \left[\left(\frac{2}{k}\right)^2 \sin\left(\frac{k}{2}x\right) \right]_{\pi/2}^{\frac{3\pi}{2}} \\
 &\quad \left. - \left[(x - 2\pi) \frac{2}{k} \cos\left(\frac{k}{2}x\right) \right]_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} + \left[\left(\frac{2}{k}\right)^2 \sin\left(\frac{k}{2}x\right) \right]_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \right) \\
 &= \frac{8}{\pi k^2} \left(\sin\left(\frac{k\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{3k\pi}{4}\right) \right).
 \end{aligned}$$

Die ersten drei Koeffizienten lauten

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \frac{8}{\pi} \left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) = 0, \\
 A_2 &= \frac{8}{4\pi} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right) = \frac{4}{\pi}, \\
 A_3 &= \frac{8}{9\pi} \left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{9\pi}{4}\right) \right) = 0.
 \end{aligned}$$

Die Approximation mit den ersten drei Termen ist gegeben durch

$$\tilde{u}(x, t) = u_3(x, t) = \frac{4}{\pi} \cos(t) \sin(x).$$

Es ist $u_3(x, 0) = \frac{4}{\pi} \sin(x)$. Die Anfangsbedingung für u ist also nur näherungsweise erfüllt (siehe Plot). Die zweite Anfangsbedingung ist, ebenso wie die Randbedingungen erfüllt. Was die Randbedingungen angeht, wäre alles andere auch ein sicherer Hinweis auf einen Rechenfehler!

Aufgabe 3:

Gegeben sei die Anfangsrandwertaufgabe

$$\begin{aligned}
 u_{tt} - 4u_{xx} &= e^{-t} \left(1 - \frac{x}{3}\right) & x \in (0, 3), t > 0, \\
 u(x, 0) &= 1 + 2 \sin(\pi x) & x \in [0, 3], \\
 u_t(x, 0) &= \frac{x}{3} & x \in (0, 3), \\
 u(0, t) &= e^{-t} & t \geq 0, \\
 u(3, t) &= 1 & t \geq 0.
 \end{aligned} \tag{1}$$

Überführen Sie die Aufgabe durch die Einführung einer geeigneten Funktion v in eine Anfangsrandwertaufgabe mit homogenen Randbedingungen für v .

Geben Sie die Differentialgleichung für v und die Anfangsbedingungen für v an.

Lösung:

Mit $v = u - e^{-t} - \frac{x}{3}(1 - e^{-t})$ gilt

$$u_t = v_t - e^{-t}\left(1 - \frac{x}{3}\right), \quad u_{tt} = v_{tt} + e^{-t}\left(1 - \frac{x}{3}\right), \quad v_{xx} = u_{xx}.$$

Die Differentialgleichung für v lautet dann

$$v_{tt} + e^{-t}\left(1 - \frac{x}{3}\right) - 4v_{xx} = e^{-t}\left(1 - \frac{x}{3}\right) \iff v_{tt} - 4v_{xx} = 0.$$

Als Anfangs- und Randwerte für v erhalten wir:

$$v(x, 0) = u(x, 0) - e^0 - \frac{x}{3}(1 - e^0) = 1 + 2 \sin(\pi x) - 1 = 2 \sin(\pi x),$$

$$v_t(x, 0) = u_t(x, 0) + e^0 - \frac{x}{3} \cdot e^0 = 1,$$

$$v(0, t) = v(3, t) = 0.$$