

## Komplexe Funktionen für Studierende der Ingenieurwissenschaften

### Hausaufgabenblatt 7, Lösungen

Tutoren gesucht:

Für die Durchführung und Korrektur von Übungen  
zu Mathematik III im Wintersemester 2023/24  
suchen wir noch studentische Tutoren.

Bewerbungen bitte per email (bis Vorlesungsende) an  
Kai Rothe ([rothe@math.uni-hamburg.de](mailto:rothe@math.uni-hamburg.de))

mit Namen, Matrikelnummer, Studiengang  
und bisherigen Klausurergebnissen in Mathematik.

**Aufgabe 1:**

Man bestimme die Laurententwicklung der folgenden Funktionen und gebe jeweils den Koeffizienten  $a_{-1}$  der Reihe an:

- a)  $f(z) = \frac{\exp(z-2)}{z-2}$  im Punkt  $z_0 = 2$ ,
- b)  $f(z) = z^2 \cosh\left(\frac{1}{z+1}\right)$  im Punkt  $z_0 = -1$ ,
- c)  $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^7}$  im Punkt  $z_0 = 0$ .

**Lösung:**

- a) Für  $|z-2| > 0$  gilt:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\exp(z-2)}{z-2} = \frac{1}{z-2} \left( 1 + \frac{z-2}{1!} + \frac{(z-2)^2}{2!} + \frac{(z-2)^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{z-2} + 1 + \frac{z-2}{2!} + \frac{(z-2)^2}{3!} + \frac{(z-2)^3}{4!} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2)^{n-1}}{n!} \Rightarrow a_{-1} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad f(z) &= z^2 \cosh\left(\frac{1}{z+1}\right) = ((z+1)-1)^2 \cosh\left(\frac{1}{z+1}\right) \\ &= ((z+1)^2 - 2(z+1) + 1) \left( 1 + \frac{1}{2!(z+1)^2} + \frac{1}{4!(z+1)^4} + \dots \right) \\ &= (z+1)^2 - 2(z+1) + \frac{3}{2} - \frac{1}{z+1} + \left( \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} \right) \frac{1}{(z+1)^2} \\ &\quad - \frac{2}{4!(z+1)^3} + \left( \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} \right) \frac{1}{(z+1)^4} \dots \\ &= (z+1)^2 - 2(z+1) + \frac{3}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k)!} (z+1)^{1-2k} \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{(2k)!} + \frac{1}{(2(k+1))!} \right) (z+1)^{-2k} \Rightarrow a_{-1} = -1 \end{aligned}$$

- c) Einzige Singularität von  $f$  ist der Entwicklungspunkt  $z_0 = 0$ . Für  $|z| > 0$  gilt:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z - \sin z}{z^7} = \frac{1}{z^7} \left( z - \left( z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \frac{z^9}{9!} \mp \dots \right) \right) \\ &= \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{z^4} - \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{z^2} + \frac{1}{7!} - \frac{z^2}{9!} \pm \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} z^{2n-6} \\ &\Rightarrow a_{-1} = 0 \end{aligned}$$

**Aufgabe 2:**

Man berechne unter Verwendung des Residuenkalküls die folgenden Integrale

a)  $\int_0^\infty \frac{1}{x^{5/2} + 13x^{3/2} + 36x^{1/2}} dx,$

b)  $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx,$

c)  $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^4 + 10x^2 + 9} dx,$

d)  $\int_{-\infty}^\infty \frac{\cos(3x)}{x^2 - 6x + 10} dx.$

**Lösung:**

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \int_0^\infty \frac{1}{x^{5/2} + 13x^{3/2} + 36x^{1/2}} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{dx}{x^{1/2}(x^2 + 13x + 36)} = \int_0^\infty \frac{dx}{x^{1/2}(x+4)(x+9)} \\ &= \frac{2\pi i}{1 - e^{-2\pi i/2}} \left( \operatorname{Res}\left(\frac{1}{x^{1/2}(x+4)(x+9)}; -4\right) + \operatorname{Res}\left(\frac{1}{x^{1/2}(x+4)(x+9)}; -9\right) \right) \\ &= \pi i \left( \frac{1}{\sqrt{-4}(-4+9)} + \frac{1}{\sqrt{-9}(-9+4)} \right) = \frac{\pi}{5} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + (z + 1/z)/2} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 4z + 1} \\ &= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \underbrace{\frac{1}{(z + 2 - \sqrt{3})(z + 2 + \sqrt{3})}}_{=f(z)} dz \\ &= 2\pi i \cdot \frac{2}{i} \cdot \operatorname{Res}\left(f; -2 + \sqrt{3}\right) \\ &= 4\pi \cdot \frac{1}{-2 + \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 10x^2 + 9} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{(x+i)(x-i)(x+3i)(x-3i)}}_{=f(x)} dx = 2\pi i (\operatorname{Res}(f; i) + \operatorname{Res}(f; 3i)) \\
 &= 2\pi i \left( \frac{1}{(i+i)(i^2+9)} + \frac{1}{((3i)^2+1)(3i+3i)} \right) = \pi \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{(-8) \cdot 3} \right) = \frac{\pi}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(3x)}{x^2 - 6x + 10} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} \left( \frac{e^{3ix}}{(x-3)^2 + 1} \right) dx \\
 &= \operatorname{Re} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{e^{3ix}}{(x-(3+i))(x-(3-i))}}_{=f(x)} dx \right) \\
 &= \operatorname{Re} (2\pi i \operatorname{Res}(f; 3+i)) = \operatorname{Re} \left( 2\pi i \frac{e^{3i(3+i)}}{3+i-(3-i)} \right) \\
 &= \operatorname{Re} (\pi e^{-3+9i}) = \pi e^{-3} \cos 9
 \end{aligned}$$

**Abgabetermin:** 7.7.